

Вид: Просо посівне Panicum miliaceum L.

Заявка №: 10006001 Назва сорту Заповітне

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 10.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.04.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140454

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Прапорцевий листок: положення пластинки	напівпрямостояче	3
2	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
4	Прапорцевий листок: за довжиною	короткий	3
5	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5
6	Стебло: кількість вузлів	мало	3
7	Стебло: довжина верхнього міжвузля	середнє	5
8	Стебло: товщина міжвузля	товсте	7
9	Час виявлення волоті (50% рослин з волотями)	середній	5
10	Рослина: за висотою (стебло та волоть)	висока	7
11	Волоть: кут відхилення гілочок	дуже гострий	1
12	Волоть: положення	злегка похила	2
13	Волоть: за довжиною (без ніжки)	довга	7
14	Волоть: за шириною	вузька	3
15	Волоть: за щільністю	середня	5
16	Волоть: ступінь викривлення бічних гілочок	слабке	3
17	Волоть: кількість подушечок	багато	7
18	Волоть: довжина головної гілочки	середня	5
19	Колосок: форма	вузькоеліптична	1
20	Колосок: інтенсивність жовтого забарвлення	сильна	7
21	Луска: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
22	Маточка: забарвлення	фіолетове	2
23	Зернівка: за розміром	середня	5
24	Зернівка: форма	широкоеліптична	2
25	Зернівка: забарвлення	помірно жовте	4
26	Зернівка: плямистість	відсутня	1
27	Зернівка: розмір плям	ознака не визначалась	0
28	Маса 1000 зерен	дуже велика	9
29	Ядро (не шліфоване): забарвлення	світло-жовте	2
30	Ядро: інтенсивність коричневого забарвлення плацентної плями	помірна	5
31	Зернівка: тип ендосперму	ознака не визначалась	0
32.1	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Pasa 1	ознака не визначалась	0
32.2	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Pasa 2	ознака не визначалась	0
32.3	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Pasa 3	ознака не визначалась	0
32.4	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Pasa 4	ознака не визначалась	0
32.5	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Pasa 5	ознака не визначалась	0
32.6	Стійкість до ураження расами сажки (Sporisorium destruens Yank): Pasa 6	ознака не визначалась	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	22,8	33,4	29,2
Гарантоване відхилення:			
ц/га	0,3	0,7	0,2
%	1,3	2,1	0,7
Днів до досягання	82	89	96
Висота рослин, см	101,0	104,8	112,6
Стійкість до:			
вилагання	8,1	8,4	7,4
осипання	8,2	8,0	8,5
посухи	7,4	8,4	8,5
Стійкість проти:			
сажки	9,0	9,0	9,0
бактеріальної плямистості	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	13,7	13,3	12,3

плівчатість	16,7	17,2	17,3
вихід крупи	77,5	77,0	77,2
Маса 1000 зерен, г	7,7	8,3	8,3
Напрямок використання	харчовий	харчовий	харчовий

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту**

Лісостеп