

Вид: Кабачок Cucurbita pepo L.var. giromontia Duch.

Заявка №: 10026002 Назва сорту Аймаран

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 02.07.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

10.04.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140503

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: форма сім'ядолей	вузькоеліптична	1
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірне	5
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	випукла	3
4	Рослина: габітус	кущовий	1
5	Рослина: галуження	відсутнє	1
6	Рослина: галуження стебла	ознака не визначалась	0
7	Тільки для кущових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	напівпряме	3
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1
12	Листкова пластинка: за розміром	велика	7
13	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірне	5
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначалась	0
17	Черешок: за довжиною	середній	5
18	Черешок: кількість шипів	кілька	3
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	зелене	2
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	сильне	7
22	Чоловіча квітка: вираження кільця всередині віночка	наявне	9
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте і зелене	3
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення кільця всередині віночка	ознака не визначається	0
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	велике	7
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма	циліндрична	5
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або борозенок)	зелене	4
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	світле	3
30	Плід: переважна форма	циліндрична	9
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	середній	5
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	малий	3
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	середнє	5
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: за розміром	ознака не визначається	0
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: за розміром	ознака не визначається	0
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираженість екваторіального краю	ознака не визначається	0
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма маточкового кінця	ознака не визначається	0
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0

41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	відсутнє	1
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: форма маточкового кінця	округла	1
46	Плід: борозенки	відсутні	1
47	Плід: глибина борозенок	ознака не визначалась	0
48	Плід: ребра	наявні	9
49	Плід: ступінь виявлення ребер	дуже слабо	1
50	Плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення плям, крапок, смужок і смуг не брати до уваги)	кремове	2
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
52	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
53	Лише сорти з основним подвійним забарвленням шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0
54	Плід: смужки на гранях	відсутні	1
55	Плід: колір смужок на гранях	ознака не визначалась	0
56	Плід: забарвлення ребер відносно основного забарвлення шкірки (як для 50)	однакове	1
57	Плід: плямистість	відсутня	1
58	Плід: переважний розмір плям	ознака не визначалась	0
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (плями до уваги не беруть)	відсутнє	1
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначалась	0
64	Плід: розмір квіткового рубця	середній	5
65	Плід: довжина плодоніжки	коротка	3
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	темне	7
68	Плід: крапчастість (плямистість) плодоніжки	наявна	9
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок не брати до уваги)	кремове	3
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначається	0
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення (як для 69)	ознака не визначалась	0
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	відсутній	1
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначалась	0
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9
76	Стиглий плід: структура м'якоті	волокниста	2
77	Насінина: за розміром	велика	7
78	Насінина: форма	еліптична	5
79	Насінина: лущпиння	наявне	9
80	Насінина: наявне лущпиння	повністю розвинене	2
81	Насіння: за кольором	кремове	2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Вміст сухої речовини 5,2 %, тривалість періоду до настання технічної стиглості 45 діб.

*Дані надані заявником.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, лісостеп, полісся.