

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus*

Заявка №: 13118002 Назва сорту Ірен

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.05.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140649

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Сім'ядолі: за розміром	малі	3
4	Листкова розетка: за шириною зростання біля основи	вузька	3
5	Листок: положення у просторі	висхідне	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листкова пластинка: за формою	оберненояйцевидна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	сіруватий	3
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	мало	3
12	Листкова пластинка: надрізи країв	наявні	9
13	Листкова пластинка: глибина розрізів краю	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5
15	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
17	Коренеплід: за товщиною, см	тонкий	3
18	Коренеплід: товщина головного кореня	тонкий	3
19	Коренеплід: за формою	еліптичний	3
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3
21	Коренеплід: форма основи	тупа	3
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині	багряний	2
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: товщина кори	тонка	3
27	Коренеплід: забарвлення м'якоти	матове біле	2
28	Час досягання	дуже ранній	1
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

\*Товарна урожайність 2,3 кг/м<sup>2</sup>, середня маса плоду 60 г, тривалість періоду до досягання 30 діб, вміст сухої речовини, вміст вітаміну С 36,7 мг%.

\*Дані надіні заявником.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Закритий ґрунт