Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera
Заявка №: 10016066 **Назва сорту** Меріва КЛ
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 03.11.2014 **Патент №:** 140716
Дата пріоритету 30.11.2010
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.09.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 140889

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	20,0	34,2	24,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га	0,4	3,4	0,4
Прибавка до національного стандарту, %	2,0	11,0	1,7
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-1,4	6,1	-2,5
Прибавка до умовного стандарту, %	-7	22	-9
Стійкість до вилягання, бал	8,4	8,6	9,0
Стійкість до посухи, бал	7,5	7,7	8,8
Стійкійсть до осипання, бал	7,2	7,0	7,8
Зимостійкість, бал	6,9	7,9	8,3
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,0	9,0	8,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	26,0	25,9	18,8
Вміст жиру, %	41,4	42,8	48,8
Вміст глюкозинолатів, %	0,9	0,8	0,8
Вміст ерукової кислоти, %	0,0	0,1	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся