**Вид:** Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera
**Заявка №:** 10016062 **Назва сорту** Румба
**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.11.2014 **Патент №:** 140714
**Дата пріоритету** 30.11.2010
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 24.09.2014
**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 140887

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|---|---|---|---|
| 1 | Насіння: ерукова кислота | відсутня | 1 |
| 2 | Сім'ядоля: за довжиною | середня | 5 |
| 3 | Сім'ядоля: за шириною | середня | 5 |
| 4 | Листок: інтенсивність зеленого кольору | помірний | 5 |
| 5 | Листок: наявність часток | наявні | 9 |
| 6 | Листок: кількість часток (повний розвиток листка) | середня кількість | 5 |
| 7 | Листок: зубчастість краю | помірна | 5 |
| 8 | Листок: за довжиною (пластинка і черешок) | довгий | 7 |
| 9 | Листок: за шириною (у найширшому місці) | середній | 5 |
| 10 | Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка | довгий | 7 |
| 11 | Рослина: час цвітіння | середній | 5 |
| 12 | Квітка: колір пелюсток | жовтий | 3 |
| 13 | Квітка: довжина пелюсток | короткі | 3 |
| 14 | Квітка: ширина пелюсток | вузькі | 3 |
| 15 | Рослина: утворення пилку | наявне | 9 |
| 16 | Рослина: за висотою (за повного цвітіння) | висока | 7 |
| 17 | Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно) | середня | 5 |
| 18 | Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем) | довгий | 7 |
| 19 | Стручок: довжина зубця | середній | 5 |
| 20 | Стручок: довжина ніжки | середня | 5 |
| 21 | Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 22 | Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби | ознака не визначається | 0 |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник | Значення | | |
|---|---|---|---|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 20,4 | 33,4 | 25,4 |
| Прибавка до національного стандарту, ц/га | 0,8 | 2,6 | 1,2 |
| Прибавка до національного стандарту, % | 4,1 | 8,4 | 5,0 |
| Прибавка до умовного стандарту, ц/га | -0,9 | 5,2 | -1,6 |
| Прибавка до умовного стандарту, % | -4 | 19 | -6 |
| Стійкість до вилягання, бал | 8,4 | 8,5 | 8,8 |
| Стійкість до посухи, бал | 7,4 | 7,5 | 8,8 |
| Стійкійсть до осипання, бал | 7,1 | 7,2 | 7,9 |
| Зимостійкість, бал | 6,8 | 7,6 | 8,3 |
| Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал | 8,1 | 9,0 | 8,3 |
| Стійкість до бактеріозу, бал | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Стійкість до пероноспорозу, бал | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Вміст білку, % | 24,3 | 23,3 | 18,5 |
| Вміст жиру, % | 44,5 | 44,4 | 48,9 |
| Вміст глюкозинолатів, % | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Вміст ерукової кислоти, % | 0,3 | 0,2 | 0,0 |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту**

Степ, Лісостеп, Полісся