

Вид: Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка №: 10047001 Назва сорту Надія Поділля

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 03.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140381

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: відношення довжини до ширини листочків (другого справжнього листка)	середнє	5
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення на основі стебла	слабке	3
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків (напередодні цвітіння)	світле	3
5	Час початку цвітіння (30 % рослин)	середній	5
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	наявне	9
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	відсутнє або дуже слабке	1
8	Листок: форма верхівки листочків (на середній третині рослини)	пряма	5
9	Листок: ширина листочків (як для 8)	вузькі	3
10	Прилистки: антоціанове забарвлення залозок	відсутнє або дуже слабке	1
11	Квітка: забарвлення паруса	світло-фіолетовий	3
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1
13	Біб: за довжиною	середній	5
14	Біб: за шириною	середній	5
15	Біб: довжина дзьобика	середній	5
16	Біб: кількість насінних зачатків	середня кількість	5
17	Насіння: за розміром	середнє	5
18	Насіння: за формою	кулясте	1
19	Насіння: основне забарвлення насінної оболонки	сіро-коричнєве	2
20	Насіння: коричнева орнаментация	тільки дифузна	2
21	Насіння: вираження коричневої орнаментации	слабке	3
22	Насіння: блакитно-чорна орнаментация	тільки плями	3
23	Насіння: виявлення блакитно-чорної орнаментации	дуже слабке	1
24	Насіння: забарвлення сім'ядолей	сірувато-коричнєве	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	41,2	50,2	64,1
Гарантована різниця, ц/га	-3,8	2,6	-1,5
%	-8	6	-2
Вегетаційний період, днів	58	61	59
Стійкість до, бал			
вилягання	7,5	7,0	6,8
осипання	7,6	7,8	7,7
посухи	8,3	8,5	8,3
аскохітозу	8,8	8,0	9,0
іржі	9,0	9,0	9,0
Залистяність, %	62,1	58,9	55,2
Вміст сирого протеїну, %	19,4	19,1	21,4
Напрямок використання	кормовий		

Географічні та нові рекомендації використання сорту

Лісостеп