Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.
Заявка №: 11018021 **Назва сорту** ЛІССАБОН
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №:**
Дата пріоритету 29.11.2011
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141067

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	сильна	7
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояйцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	темне	7
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім’яніжки рубчика	як у насінної оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4
20	Рослина: час достигання	ранній	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18,9	23,8	21,4
Прибавка до національного стандарту, ц/га	3,2	2,5	2,8
Прибавка до національного стандарту, %	20,4	11,7	15,1
Маса 1000 насінин, г	139,2	183,4	166,9
Висота рослин, см	67,7	67,7	68,7
Стійкість проти, бал:			
- вилягання	9,0	8,9	8,8
- осипання	9,0	8,7	8,6
- засухи	8,3	8,5	8,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,2	10,9	11,7
Стійкість проти, бал:			
- пероноспорозу	9,0	9,0	9,0
- аскохітозу	9,0	9,0	9,0
- бактеріозу	9,0	9,0	9,0
- септоріозу	9,0	9,0	9,0
- фузаріозу	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	39,5	39,1	39,1
Вміст олії, %	22,1	21,0	20,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся