Вид: Ячмінь звичайний (ярий) Hordeum vulgare L.
Заявка №: 08012036 **Назва сорту** Виенна
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №:**
Дата пріоритету
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141083

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабке	3
5	Рослина: частота рослин з викривленим прапорцевим листком	мало	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізнє	7
8	Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильне	7
10	Колос: восковий наліт	помірний	5
11	Колос: положення у просторі	пряме	1
12	Рослина: за висотою (стебло, колос з остюками)	дуже низька	1
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довші	3
18	Стрижень колосу: довжина першого сегменту	короткий	3
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3
21	Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки	рівна	2
22	Зернівка: довжина волосків основної щетинки	довгі	2
23	Зернівка: наявність плівки	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луск	помірне	5
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алейронового шару	біляста	1
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Виростина зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	ознака не визначалась	0
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявна	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц / га	28,6	45,4	39,1
Гарантована прибавка, +,- до нац.ст. ц/га	0,7	4,6	3,3
%	2,5	11,2	9,2
Вегетаційний період, дн.	81	82	84
Висота рослин, см	50	59,1	61,8
Маса 1000 насінин, г	40	47,9	45,5
Стійкість до : бал			
- вилягання	9	8,4	8,5
- осипання	9	8,4	8,6
- посухи	6,7	7,9	8,6
- гельмінтоспоріозу	8,3	8,7	7,5

- сажки	9	9	8,7
- борошнистої роси	8,4	9	7,8
Якісні характеристики:			
- вміст білку, %	13,8	13,4	12,5
- вирівняність зерна, %	91,1	96,7	96,36
Напрям використання	зерновий	зерновий	пивоварний

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся