**Вид:** Редька посівна (редиска) Raphanus sativus L. var. sativus
**Заявка №:** 11038001 **Назва сорту** Рання Сара
**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** **Патент №:**
**Дата пріоритету**
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.12.2014
**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 141034

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|---|---|---|---|
| 1 | Плоїдність | диплоїд | 2 |
| 2 | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля | наявне | 9 |
| 3 | Сім‘ядолі: за розміром | малі | 3 |
| 4 | Листкова розетка: за шириною зростання біля основи | вузька | 3 |
| 5 | Листок: положення у просторі | напіввисхідне | 3 |
| 6 | Листок: за довжиною | короткий | 3 |
| 7 | Листкова пластинка: за формою | оберненояйцевидна | 3 |
| 8 | Листкова пластинка: форма верхівки | округла | 2 |
| 9 | Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору | відсутній | 1 |
| 10 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору | помірна | 5 |
| 11 | Листкова пластинка: кількість лопатей | мало | 3 |
| 12 | Листкова пластинка: надрізи країв | наявні | 9 |
| 13 | Листкова пластинка: глибина розрізів краю | помірні | 5 |
| 14 | Листкова пластинка: опушення | помірне | 5 |
| 15 | Черешок: антоціанове забарвлення | наявне | 9 |
| 16 | Черешок: інтенсивнісь антоціанового забарвлення | помірна | 5 |
| 17 | Коренеплід: за товщиною, см | середній | 5 |
| 18 | Коренеплід: товщина головного кореня | тонкий | 3 |
| 19 | Коренеплід: за формою | оберненояйцеподібний | 4 |
| 20 | Коренеплід: форма верхівки | плеската | 2 |
| 21 | Коренеплід: форма основи | тупа | 3 |
| 22 | Коренеплід: забарвлення шкірки | однокольорове | 1 |
| 23 | Коренеплід: забарвлення верхньої частини | червоне | 3 |
| 24 | Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині | карміновий | 3 |
| 25 | Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки | ознака не визначається | 0 |
| 26 | Коренеплід: товщина кори | тонка | 3 |
| 27 | Коренеплід: забарвлення м’якоті | матове біле | 2 |
| 28 | Час достигання | ранній | 3 |
| 29 | Коренеплід: здатність до утворення дупла | відсутня або дуже слабка | 1 |

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність - 15 т/га, середня маса плоду - 25 г, тривалість періоду до достигання - 25 діб, вміст сухої речовини - 6,5%, вміст вітаміну С - 33,5 мг%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**
Степ, Лісостеп, Полісся