

Вид: Коноюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.

Заявка №: 09052001 Назва сорту Павлина

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.05.2014 Патент №: 140459

Дата пріоритету 16.02.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.05.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140827

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|-----------------------|-----|
| 1 | Насіння: забарвлення шкірки | фіолетове | 2 |
| 2 | Плоїдність | диплоїд | 2 |
| 3 | Сім'ядолі: за довжиною | ознака не визначалась | 0 |
| 4 | Сім'ядолі: за шириною | ознака не визначалась | 0 |
| 5 | Рослина: за висотою у рік сівби | низька | 3 |
| 6 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби | ознака не визначалась | 0 |
| 7 | Рослина: габітус восени у рік сівби | ознака не визначалась | 0 |
| 8 | Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби | ознака не визначалась | 0 |
| 9 | Рослина: за висотою навесні | ознака не визначалась | 0 |
| 10 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною | ознака не визначалась | 0 |
| 11 | Рослина: час цвітіння | середній | 5 |
| 12 | Стебло: за довжиною | середнє | 5 |
| 13 | Стебло: за товщиною | середнє | 5 |
| 14 | Стебло: кількість міжвузлів | мало | 3 |
| 15 | Стебло: щільність опушення | помірне | 5 |
| 16 | Листок: форма центрального листочка | ознака не визначалась | 0 |
| 17 | Листок: довжина центрального листочка | середній | 5 |
| 18 | Листок: ширина центрального листочка | середній | 5 |
| 19 | Листок: частота трапляння білих міток | часто | 7 |
| 20 | Рослина: природна висота другого укошу | ознака не визначалась | 0 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| | С | Л | П |
| Урожайність сухої речовини, ц/га | | 66,9 | 86,4 |
| гарантована прибавка | | | |
| ц/га | | -0,8 | 4,2 |
| % | | -1,1 | 5,1 |
| Вегетаційний період, діб | | 57 | 78 |
| Стійкість до, бал | | | |
| вильгання | | 7,5 | 7,1 |
| посухи | | 8,4 | 8,4 |
| іржі | | 9,0 | 8,7 |
| бурої плямистості | | 9,0 | 8,3 |
| антракнозу | | 9,0 | 9,0 |
| Перезимувало рослин, бал | | 8,3 | 6,9 |
| Залистяність, % | | 44,4 | 51,9 |
| Вміст сирого протеїну, % | | 17,8 | 17 |
| Напрямок використання | | кормовий | кормовий |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся