

Вид: Пшениця м'яка (озима) Triticum aestivum L.

Заявка №: 10007029 Назва сорту Оберіг Миронівський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 17.03.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.05.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140840

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|----------------------------|-----|
| 1 | Колеоптіль: ступінь антоціанового забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 2 | Рослина: форма куща (габітус) | прямостоячий | 1 |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 4 | Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка | рідко | 3 |
| 5 | Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | середнє | 5 |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | помірний | 5 |
| 7 | Колос: восковий наліт | помірний | 5 |
| 8 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | помірний | 5 |
| 9 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | висока | 7 |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом) | слабо виповнена | 3 |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку) | циліндрична | 2 |
| 12 | Колос: за щільністю | середній | 5 |
| 13 | Колос: за довжиною | короткий | 3 |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок | наявні остюки | 3 |
| 15 | Колос: довжина зубців / остюків на верхівці | дуже довгі | 9 |
| 16 | Колос: колір | білий або солом'яно-жовтий | 1 |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 18 | Нижня колоскова луска : ширина плеча (колосок в середині колоса) | вужьке | 3 |
| 19 | Нижня колоскова луска: форма плеча | піднесене | 4 |
| 20 | Нижня колоскова луска: довжина зубця | короткий | 3 |
| 21 | Нижня колоскова луска: форма зубця | дуже зігнутий | 7 |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні | слабке | 3 |
| 23 | Нижня квітова луска першої квітки: форма зубця | ознака не визначалась | 0 |
| 24 | Зернівка: колір | червоний | 2 |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі | темне | 7 |
| 26 | Тип розвитку | озимий | 1 |
| 27 | Зернівка: за довжиною | середня | 5 |
| 28 | Зернівка: за шириною | середня | 5 |
| 29 | Зернівка: відношення довжина/ ширина | велике | 7 |
| 30 | Зернівка: за крупністю | крупна | 7 |
| 31 | Язичок: виявлення | середній | 5 |
| 32 | Нижня квітова луска : кіль | відсутній | 1 |
| 33 | Вушка: за формою | гострі | 2 |
| 34 | Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні | слабке | 3 |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса) | овально-ланцетна | 3 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|------------------------------------|----------|------|------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 42,6 | 63,1 | 55,9 |
| +, - до нац. ст., ц/га | -5,1 | 3,5 | 2,4 |
| % | -10,7 | 5,9 | 4,5 |
| Максим. урожайність, ц/га | | 97,2 | |
| Вегетаційний період, днів | 264 | 274 | 281 |
| Висота рослин, см | 75 | 85 | 86 |
| Маса 1000 зерен, г | 39,9 | 45,4 | 45,7 |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | 7,9 | 8,0 | 8,7 |
| Стійкість до, бал: полягання | 7,9 | 8,2 | 8,3 |
| осипання | 8,8 | 8,2 | 8,6 |
| посухи | 7,9 | 7,8 | 8,8 |
| борошнистої роси | 7 | 8 | 7 |
| бурої іржі | 9 | 9 | 7 |
| фузаріозу | 9 | 9 | 7 |
| Вміст білку, % | 14,4 | 13,8 | 13,4 |
| Вміст клейковини, % | 30,1 | 28,1 | 27,5 |

| | | | |
|----------------------|------|------|-----|
| W, о.а. | 279 | 260 | 157 |
| Об'єм хліба, мл | 1150 | 1000 | 920 |
| Напря́м використання | ц | ц | ф |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся