

Вид: Пшениця тверда (озима) Triticum durum Desf.

Заявка №: 10008002 Назва сорту Прозорий

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 02.03.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

14.07.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140797

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|----------------------------|-----|
| 1 | Колеоптіль: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 2 | Перший листок: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 3 | Рослина: габітус | пряmostоячий | 1 |
| 4 | Рослина: наявність зігнутого прапорцевого листка | відсутній або дуже рідко | 1 |
| 5 | Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | раннє | 3 |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | дуже сильний | 9 |
| 7 | Прапорцевий листок: восковий наліт на листковій пластинці (з нижнього боку) | дуже сильний | 9 |
| 8 | Остюки: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 9 | Соломина: опушення верхнього вузла | сильне | 7 |
| 10 | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі | дуже сильний | 9 |
| 11 | Колос: восковий наліт | дуже сильний | 9 |
| 12 | Рослина: за висотою (стебло і колос) | середня | 5 |
| 13 | Колос: наявність і розміщення остюків | по всій довжині колоса | 4 |
| 14 | Остюки на верхівці колоса: довжина відносно колоса | довші | 3 |
| 15 | Нижня колоскова луска: за формою | видовжена | 5 |
| 16 | Нижня колоскова луска: форма плеча | піднесене | 4 |
| 17 | Нижня колоскова луска: ширина плеча | вузьке | 3 |
| 18 | Нижня колоскова луска: довжина зубця | короткий | 3 |
| 19 | Нижня колоскова луска: форма зубця | середньо зігнутий | 3 |
| 20 | Нижня колоскова луска: опушення зовні | відсутнє | 1 |
| 21 | Соломина: виповнення (між основою колоса і верхнім вузлом) | помірне | 5 |
| 22 | Остюки: колір | білі | 1 |
| 23 | Колос: за довжиною (без остюків) | короткий | 3 |
| 24 | Колос: опушення країв нижніх 2 - 4 сегментів стрижня | помірне | 5 |
| 25 | Колос: інтенсивність забарвлення за досягання | білий | 1 |
| 26 | Колос: форма | циліндрична | 2 |
| 27 | Колос: за щільністю | середній | 5 |
| 28 | Зернівка: форма | видовжена | 7 |
| 29 | Зернівка: довжина чубка (вид зі спинки) | короткий | 3 |
| 30 | Зернівка: забарвлення у фенолі | відсутнє або дуже світле | 1 |
| 31 | Тип розвитку | озимий | 1 |
| 32 | Колос: колір | білий або солом'яно-жовтий | 1 |
| 33 | Язичок: за формою | трикутний | 2 |
| 35 | Вушка: охоплення соломини | з перекриттям | 3 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|------------------------------------|----------|------|---|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 38,1 | 61,1 | - |
| +, - до нац. ст., ц/га | -4,7 | 0,7 | - |
| % | -11,0 | 1,2 | - |
| Максим. урожайність, ц/га | 92,9 | | |
| Вегетаційний період, днів | 263 | 270 | - |
| Висота рослин, см | 73 | 78 | - |
| Маса 1000 зерен, г | 44,5 | 48,0 | - |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал | 6,2 | 6,9 | - |
| Стійкість до, бал: полягання | 8,6 | 8,1 | - |
| осипання | 8,7 | 9,0 | - |
| посухи | 7,8 | 7,7 | - |
| борошністої роси | 9 | 7 | - |
| бурої іржі | 9 | 7 | - |
| фузаріозу | 9 | 8 | - |
| Вміст білку, % | 14,4 | 13,8 | - |
| Вміст клейковини, % | - | - | - |
| W, о.а. | - | - | - |

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Об'єм хліба, мл | - | - | - |
| Напря́м використання | x | x | - |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп