

Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera

Заявка №: 09016015 Назва сорту ДК Імеджн КЛ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 04.03.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.07.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140806

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	17,6	28,5	24,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-2,6	2,5	-0,3
Прибавка до національного стандарту, %	-12,9	9,7	-1,2
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-6,5	-3,4	-5,2
Прибавка до умовного стандарту, %	-27	-11	-17
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,6	8,8
Стійкість до посухи, бал	7,1	7,6	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,4	7,0	7,6
Зимостійкість, бал	5,6	7,6	8,6
Дані ІР ім Юр'єва: % живих рослин		73,7	
Дані ІР ім Юр'єва: бал зимостійкості		7,2	
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,3	9,0	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	43,9	44,8	46,4
Вміст білку, %	24,1	22,6	20,0
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,0
Вміст глікозинолатів, %	0,6	0,8	0,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп