

Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera

Заявка №: 10016004 Назва сорту ДК Іммінент КЛ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 18.02.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.07.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140808

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	темний	7
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	21,4	29,6	28,0
Прибавка до національного стандарту, ц/га	1,2	3,6	3,1
Прибавка до національного стандарту, %	5,9	13,9	12,4
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-2,8	-2,4	-1,9
Прибавка до умовного стандарту, %	-11	-7	-6
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,6	8,5
Стійкість до посухи, бал	7,7	7,6	8,7
Стійкість до осипання, бал	7,3	7,0	7,6
Зимостійкість, бал	4,7	6,8	8,5
Дані ІР ім Юр'єва: % живих рослин		54,0	
Дані ІР ім Юр'єва: бал зимостійкості		5,9	
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,3	9,0	7,9
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	8,7
Вміст олії, %	44,0	44,8	46,6
Вміст білку, %	25,0	23,1	20,0
Вміст ерукової кислоти, %	0,0	0,1	0,0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,9	0,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся