

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*
Заявка №: 09016106 **Назва сорту** Мороз

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.07.2014 **Патент №:** 140513

Дата пріоритету 09.07.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.07.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140842

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	довгий	7
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	16,0	25,7	23,7
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-4,2	-0,3	-1,2
Прибавка до національного стандарту, %	-20,8	-1,1	-4,8
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-8,2	-6,3	-6,1
Прибавка до умовного стандарту, %	-34	-20	-20
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,4	8,6
Стійкість до посухи, бал	6,9	7,0	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,2	6,8	7,6
Зимостійкість, бал	5,3	7,0	8,5
Дані IP ім Юр'єва: % живих рослин		72,9	
Дані IP ім Юр'єва: бал зимостійкості		7,2	
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,1	9,0	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	44,3	44,6	46,2
Вміст білку, %	24,3	22,9	20,2
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,0
Вміст глікозинолатів, %	0,8	0,8	0,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп