

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.

Заявка №: 10018004 Назва сорту Сандра

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 20.06.2014 Патент №: 140542

Дата пріоритету 25.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

22.07.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140853

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	вісутнє	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчатість	дуже сильна	9
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	трикутна	2
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
11	Квітка: забарвлення	біле	1
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	світле	3
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насіння: форма	округло-видовжена	5
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насіння: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	ранній	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	21,3	23,9	18,2
Прибавка до національного стандарту, ц/га	1,7	1,0	0,2
Прибавка до національного стандарту, %	8,7	4,4	1,1
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	0,9	1,4	-2,2
Прибавка до умовного стандарту, %	5	6	-11
Маса 1000 насінин, г	129,7	141,2	145,8
Висота рослин, см	73,9	79,5	86,3
Вегетаційний період, днів	102	108	124
Стійкість до вилягання, бал	8,6	7,8	7,9
Стійкість до осипання, бал	8,5	8,6	8,7
Стійкість до засухи, бал	7,9	8,6	8,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,4	14,2	14,5
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	36,8	35,6	37,1
Вміст олії, %	23,4	23,7	22,0

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп