

Вид: Перець солодкий

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Capsicum annuum L.

Назва сорту: Світозар

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 27.03.2012 Патент №: 120204

Дата пріоритету: 01.02.2008

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110538

| №  | Ознака   | Проявлення             | Код |
|----|--|------------------------|-----|
| 1  | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля  | наявне                 | 9   |
| 2  | Рослина: за положенням у просторі  | напівпряма             | 5   |
| 3  | Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядоль до першої квітки), см   | коротка (<45)          | 3   |
| 4  | Рослина: укорочення міжвузля (у верхній частині)   | наявне                 | 9   |
| 5  | Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки) | одне або три           | 2   |
| 6  | Тільки для сортів без укорочених пагонів (на пагонах першого порядку). Рослина: довжина міжвузлів  | ознака не визначається | 0   |
| 7  | Рослина: антоціанове забарвлення на рівні вузлів   | помірне                | 5   |
| 8  | Листок: за довжиною пластинки, см  | довгий (>9)            | 7   |
| 9  | Листок: за шириною, см   | широкий (>6)           | 7   |
| 10 | Листок: зелене забарвлення   | зелене                 | 5   |
| 11 | Листок: пухирчастість  | сильна                 | 7   |
| 12 | Квітка: положення квітконіжки  | пряме                  | 1   |
| 13 | Плід: колір перед досяганням   | зеленувато-білий       | 1   |
| 14 | Плід: інтенсивність кольору перед досяганням   | світла                 | 3   |
| 15 | Плід: положення у просторі   | пряме                  | 3   |
| 16 | Плід: за довжиною (без плодоніжки), см   | короткий (4-5)         | 3   |
| 17 | Плід: діаметр, см  | великий (6-9)          | 7   |
| 18 | Плід: відношення довжина/діаметр   | мале                   | 3   |
| 19 | Плід: переважна форма поздовжнього розрізу   | округла                | 2   |
| 20 | Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)   | кругла                 | 3   |
| 21 | Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині  | помірна                | 5   |
| 22 | Плід: структура поверхні   | гладенька              | 1   |
| 23 | Плід: колір за досягання   | червоний               | 3   |
| 24 | Плід інтенсивність забарвлення за досягання  | помірна                | 5   |
| 25 | Плід: глянуватість   | помірна                | 5   |
| 26 | Плід: порожнина у плодоніжці   | відсутня               | 1   |
| 27 | Плід: глибина порожнини у плодоніжці   | ознака не визначається | 0   |
| 28 | Плід: форма верхівки   | притиснута             | 7   |
| 29 | Плід: глибина боріздки між частками  | помірні                | 5   |
| 30 | Плід: переважна кількість часток   | чотири і більше        | 4   |
| 31 | Плід: товщина м'якоті  | середня                | 5   |
| 32 | Плацента: за розміром  | середня                | 5   |
| 33 | Плодоніжка: за довжиною  | середня                | 5   |
| 34 | Плодоніжка: за товщиною  | тонка                  | 3   |
| 35 | Чашечка: за зовнішнім виглядом   | необгортаюча           | 1   |
| 36 | Плід: капсицин у плаценті  | відсутній              | 1   |
| 37 | Час початку цвітіння (поява першої квітки на квітконосному вузлі у 50 % рослин)  | середній               | 5   |
| 38 | Час досягання (зміна кольору у 50 % рослин)  | середній               | 5   |