

Вид: Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera

Заявка №: 08016061 Назва сорту Лунеді

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

07.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140227

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	14,6	22,7	21,8
Прибавка до національного стандарту, ц/га	2,1	4,0	3,2
Прибавка до національного стандарту, %	17,1	21,1	17,2
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	1,1	0,2	2,0
Прибавка до умовного стандарту, %	8	1	10
Стійкість до, бал: - вилягання	9,0	8,3	9,0
-посухи	7,1	7,5	8,6
-осипання	7,7	7,0	7,4
-ріпакового квіткоїду	8,9	9,0	8,6
-бактеріозу	9,0	9,0	9,0
-пероноспорозу	9,0	9,0	8,9
Вміст жиру, %	42,5	44,1	40,2
Вміст білку, %	26,4	24,5	26,1
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,2
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,7
Тип по якості		00	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся