

Вид: Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera
 Заявка №: 10016069 Назва сорту Макро

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 01.12.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

12.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140295

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	14,4	18,7	21,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-0,4	1,0	1,8
Прибавка до національного стандарту, %	-2,5	5,8	9,3
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	1,4	-3,2	1,7
Прибавка до умовного стандарту, %	11	-15	8
Стійкість до, бал: - вилягання	9,0	8,8	9,0
-посухи	7,2	6,5	8,8
-осипання	6,8	7,2	7,6
-ріпакового квіткоїду	7,2	8,3	8,0
-бактеріозу	9,0	9,0	9,0
-пероноспорозу	9,0	9,0	8,4
Вміст олії, %	44,6	43,5	44,8
Вміст білку, %	26,8	25,8	24,3
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,0	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,8	0,8
Тип по якості		00	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся