

Вид: Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera
 Заявка №: 09016183 Назва сорту Хіола 571 КЛ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140404

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	коротка	3
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	15,1	19,1	19,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га	0,3	1,4	-0,2
Прибавка до національного стандарту, %	2,3	8,1	-0,8
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	2,1	-2,8	-0,3
Прибавка до умовного стандарту, %	16	-13	-2
Стійкість до, бал: - вилягання	9,0	8,8	9,0
-посухи	6,8	6,9	8,8
-осипання	6,9	6,8	7,4
-ріпакового квіткоїду	6,8	9,0	8,5
-бактеріозу	9,0	9,0	9,0
-пероноспорозу	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	43,1	42,8	43,2
Вміст білку, %	26,8	25,0	24,4
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,7	0,8
Тип по якості		00	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп