

Вид: Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera

Заявка №: 09016184 Назва сорту Хіола 61

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140405

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	темний	7
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	мало	3
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	коротка	3
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	14,6	19,8	19,5
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-0,2	2,1	-0,3
Прибавка до національного стандарту, %	-1,1	12,1	-1,3
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	1,7	-2,1	-0,5
Прибавка до умовного стандарту, %	13	-10	-2
Стійкість до, бал: - вилягання	9,0	8,8	8,8
-посухи	6,4	6,8	8,8
-осипання	7,0	7,2	7,6
-ріпакового квіткоїду	6,9	9,0	7,8
-бактеріозу	9,0	9,0	9,0
-пероноспорозу	9,0	9,0	8,4
Вміст олії, %	44,0	42,6	44,1
Вміст білку, %	27,7	25,4	24,0
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,2	0,1
Вміст глікозинолатів, %	0,8	0,9	0,6
Тип по якості		00	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп