

09040054

Вид: Помідор їстівний
Lycopersicon esculentum Mill.

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Назва сорту: Комітт F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.04.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110106

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|------------------------------|-----|
| 1 | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля | наявне | 9 |
| 2 | Рослина: тип розвитку | індетермінантний | 2 |
| 3 | Тільки детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бокові стебла видаляють) | ознака не визначається | 0 |
| 4 | Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині | слабке | 3 |
| 5 | Тільки індетермінантні сорти: Стебло: довжина міжвузля між 1 і 4 суцвіттям | середнє | 5 |
| 6 | Листок: за положенням (у середній третині рослини) | похилий | 7 |
| 7 | Листок: за довжиною, см | довгий (>25) | 7 |
| 8 | Листок: за шириною | середній | 5 |
| 9 | Листок: за розсіченістю | двічі перистий | 2 |
| 10 | Листок: розмір листочків (у середній частині листка) | великий | 7 |
| 11 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | темне | 7 |
| 12 | Листок: глянсуватість (як для 6) | сильна | 7 |
| 13 | Листок: пухирчастість (як для 6) | помірна | 5 |
| 14 | Листок: розмір пухирів (як для 6) | малі | 3 |
| 15 | Листок: положення черешка листочків відносно головної осі | піднесене | 3 |
| 16 | Суцвіття: за типом (2 і 3-ї китиці) | в основному 1 гілка | 1 |
| 17 | Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття) | відсутня | 1 |
| 18 | Квітка: опушення приймочки | наявне | 9 |
| 19 | Квітка: за кольором | жовта | 1 |
| 20 | Квітконіжка: відокремлюючий шар | наявний | 9 |
| 21 | Тільки для сортів, що мають відокремлюючий шар: Квітконіжка: довжина (від відділяючого шару до чашечки), мм | середня (10-13) | 5 |
| 22 | Плід: за розміром | середній | 5 |
| 23 | Плід: відношення довжини до діаметра | середнє 1 | 5 |
| 24 | Плід: форма у повздовжньому розрізі | округла | 3 |
| 25 | Плід: ребристість біля плодоніжки | слабка | 3 |
| 26 | Плід: у поперечному розрізі | круглий | 2 |
| 27 | Плід: поглиблення біля плодоніжки | слабке | 3 |
| 28 | Плід: розмір рубчику плодоніжки | маленький | 3 |
| 29 | Плід: розмір квіткового рубця | маленький | 3 |
| 30 | Плід: форма кінця плоду | від заглибленої до плескатої | 2 |
| 31 | Плід: розмір плаценти у поперечному розрізі | середній | 5 |
| 32 | Плід: за товщиною перикарпу | товстий | 7 |
| 33 | Плід: кількість камер | три-чотири | 3 |

| | | | |
|----|---|------------------------|---|
| 34 | Плід: зелене плече (перед досяганням) | відсутнє | 1 |
| 35 | Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням) | ознака не визначається | 0 |
| 36 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням) | ознака не визначається | 0 |
| 37 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення перед досяганням | світла | 3 |
| 38 | Плід: колір за досягання | червоний | 5 |
| 39 | Плід: колір м'якоти (за досягання) | червоний | 5 |
| 40 | Плід: за твердістю | твердий | 7 |
| 41 | Плід: строк лежкості | довгий | 7 |
| 42 | Час цвітіння | помірно | 5 |
| 43 | Час досягання | помірно | 5 |
| 44 | Плід: вміст сухої речовини (за досягання) | помірний | 5 |
| 45 | Наявність сріблястості | наявна | 9 |