

Вид: Капуста кольрабі Brassica oleracea L. var. gongylodes L.

Заявка №: 11105001 **Назва сорту** Колібрі

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.12.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130498

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення сім'ядолей	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	ознака не визначається	0
3	Черешок: перехресування	ознака не визначалась	0
4	Черешок: за довжиною	середній	5
5	Черешок: за товщиною	ознака не визначалась	0
6	Черешок: за положенням у просторі	ознака не визначалась	0
8	Листкова пластинка: за довжиною	ознака не визначалась	0
9	Листкова пластинка: за шириною	ознака не визначалась	0
10	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	4
11	Листкова пластинка: розділення на частки стосовно центральної жилки (в нижній частині листка)	ознака не визначалась	0
12	Листкова пластинка: кількість часток (у верхній частині листка)	ознака не визначалась	0
13	Листкова пластинка: глибина розчленування (у верхній частині листка)	ознака не визначалась	0
14	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	опукла	3
15	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5
16	Листкова пластинка: восковість	помірна	5
17	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	1
18	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
19	Стеблоплід: кількість внутрішніх листків	ознака не визначалась	0
20	Стеблоплід: колір шкірки	ознака не визначалась	0
21	Стеблоплід: форма у поздовжньому розрізі	ознака не визначалась	0
22	Стеблоплід: форма верхівки	рівна	5
23	Рослина: початок збиральної стиглості	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 20 т/га. Період від повних сходів до початку досягання 70 діб. Вміст сухої речовини 9,2%. Вміст загального цукру 8%. Вміст вітаміну С 62мг%. Лежкість 5 балів. Ураженість хворобами: бактеріозом судинним 1%, слизовим 1%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся