

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка №: 12035010 Назва сорту Данді

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.07.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140867

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середні	5
4	Листкова пластинка: положення у просторі	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	тупа	3
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3
10	Листок: хвилястість країв	помірна	2
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5
13	Рослина: виявлення статі	гіномоноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2 або 3	4
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	великий	7
19	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	мале	3
21	Плід: форма поперечного перерізу	кутаста	3
22	Плід: форма основи плоду	з шийкою	1
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	середня	5
24	Плід: форма верхівки	тупа	2
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	темне	7
27	Плід: ребристість	сильна	3
28	Плід: шви	наявні	9
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9
30	Плід: зморшкуватості	слабка	3
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: щільність покриву	щільний	7
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав'язі	ознака не визначається	0
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	великі	7
36	Плід: довжина смужок	середні	5
37	Плід: плямистість	відсутня	1
38	Плід: характер поширення плям	ознака не визначалась	0
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	ознака не визначалась	0
40	Плід: щільність плям	ознака не визначалась	0
41	Плід: наліт	слабкий	3
42	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелений	3
44	Стійкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	наявна	9
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка ( <i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2
46	Стійкість до борошнистої роси ( <i>Podosphaera xanthii</i> )	сприйнятливий	1
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	сприйнятливий	1
48	Стійкість до бурої плямистості ( <i>Corynespora melonis</i> )	наявна	9
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (ZYMV)	відсутня	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 2 кг/м<sup>2</sup>, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості 40 діб, період плодоношення 55 діб, вміст сухої речовини в плоді 4,3%.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**  
Закритий ґрунт