

Вид: Перець однорічний (гіркий) Capsicum annuum L.

Заявка №: 11036005 Назва сорту Хай Флай

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 28.09.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

19.06.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140836

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
2	Рослина: габітус	прямий	1
3	Рослина: довжина головного стебла	коротке	3
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	помірне	5
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3
10	Рослина: за висотою	висока	7
11	Листок: довжина пластинки	середня	5
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
14	Листок: за формою	овальний	2
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
16	Листок: пухирчастість	дуже слабка	1
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірно увігнута	3
18	Листок: глянуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	пряме	1
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	темне	7
23	Плід: антоціанове забарвлення	наявне	9
24	Плід: положення у просторі	поникле	3
25	Плід: за довжиною	довгий	7
26	Плід: діаметр	малий	3
27	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	вузько трикутна	8
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	кругла	3
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	слабка	3
32	Плід: структура поверхні	злегка зморшкувата	2
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	помірне	5
35	Плід: глянуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина у плодоніжці	наявна	9
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	середня	5
38	Плід: форма верхівки	загострена	2
39	Плід: глибина борозенок між частками	відсутні або дуже мілкі	1
40	Плід: кількість часток	переважно дві	1
41	Плід: товщина м'якоті	тонка	3
42	Плодоніжка: за довжиною	довга	7
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	обгортаюча	2
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3
47	Час досягання	ранній	3
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco MosaicVirus (0))	наявна	9
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato MosaicVirus (1-2))	наявна	9
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	наявна	9
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	наявна	9
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	наявна	9

49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	наявна	9
50	Стійкість до Phytophthora capsici	наявна	9
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	наявна	9
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	наявна	9
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна урожайність 3 кг/м², середня маса плоду 45 г, тривалість періоду до досягання 107 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Закритий ґрунт