

Вид: Перець однорічний (солодкий) Capsicum annuum L.

Заявка №: 11037007 Назва сорту Турбін

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

27.12.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130500

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: габітус	прямий	1
3	Рослина: довжина головного стебла	середнє	5
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослинах без чеканки)	ознака не визначалась	0
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	середні	5
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	дуже сильне	9
9	Стебло: опушення вузлів	ознака не визначалась	0
10	Рослина: за висотою	ознака не визначалась	0
11	Листок: довжина пластинки	довга	7
12	Листок: ширина пластинки	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
14	Листок: за формою	ознака не визначалась	0
15	Листок: хвилястість краю	ознака не визначалась	0
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма в поперечному перерізі	ознака не визначалась	0
18	Листок: глянуватість	ознака не визначалась	0
19	Квітконіжка: положення	ознака не визначалась	0
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	ознака не визначалась	0
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	ознака не визначалась	0
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	ознака не визначалась	0
23	Плід: антоціанове забарвлення	ознака не визначалась	0
24	Плід: положення у просторі	горизонтальне	2
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	округла	2
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	ознака не визначалась	0
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	ознака не визначалась	0
32	Плід: структура поверхні	дуже зморшкувата	3
33	Плід: забарвлення (за досягання)	жовте	1
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	світле	3
35	Плід: глянуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина у плодоніжці	ознака не визначалась	0
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	глибока	7
38	Плід: форма верхівки	ознака не визначалась	0
39	Плід: глибина борозенок між частками	ознака не визначалась	0
40	Плід: кількість часток	переважно дві	1
41	Плід: товщина м'якоті	ознака не визначалась	0
42	Плодоніжка: за довжиною	ознака не визначалась	0
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: за характером виявлення	ознака не визначалась	0
45	Плід: капсицин у плаценті	наявний	9
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягання	ознака не визначалась	0
48,1	Стійкість до Tobacco Mosaic Virus: Патотип 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість до Tobacco Mosaic Virus: Патотип 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість до Tobacco Mosaic Virus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	ознака не визначалась	0

49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1 – 2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарний урожай 40 т/га. Середня маса плоду 130г. Дів до досягання - 80. Суха речовина 10,3 %. Загальний цукор 6,8%. Вітамін С 290мг/%. Клітковина 0,1%. Товщина стінки плоду 5мм. Ураження хворобами: антракнозом - 4 %, гниллю верхівковою - 3 %.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Степ, Лісостеп, Полісся