

Вид: Горох посівний Pisum sativum L.

Заявка №: 09001002 Назва сорту Аудіт

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.08.2013 Патент №: 130017

Дата пріоритету 18.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.04.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130169

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	ознака не визначалась	0
3	Стебло: фасціація	відсутня	1
4	Стебло: за довжиною	середнє	5
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня кількість	5
6	Листя: забарвлення	зелене	2
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листя. (Озн. 6, стан 2). Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
8	Листок: вторинні листочки	відсутні	1
9	Листок: кількість вторинних листочків	ознака не визначалась	0
10	Вторинний листочок: за розміром	ознака не визначалась	0
11	Вторинний листочок: за довжиною	ознака не визначалась	0
12	Вторинний листочок: за шириною	ознака не визначалась	0
13	Вторинний листочок: положення найширшої частини	ознака не визначалась	0
14	Вторинний листочок: зубчастість	ознака не визначалась	0
15	Прилисток: за довжиною	середній	5
16	Прилисток: за шириною	середній	5
17	Прилисток: за розміром	ознака не визначалась	0
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	ознака не визначалась	0
19	Прилисток: частина під пазухою за довжиною	ознака не визначалась	0
20	Прилисток: плямистість	наявна	9
21	Прилисток: щільність плямистості	не щільна	3
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листка чи вусика	середній	5
23	Лише сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначається	0
24	Час цвітіння	ранній	3
26	Лише сорти з антоціаном. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
27	Лише сорти без антоціану. Квітка: колір паруса	білий	1
28	Квітка: ширина паруса	вузька	3
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5
30	Квітка: хвилястість паруса	сильна	7
31	Квітка: ширина чашолистка	середня	5
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	округла	3
33	Квітконіжка: за довжиною	ознака не визначалась	0
34	Квітконіжка: відстань від стебла до першого бобу	середня	5
35	Квітконіжка: відстань між першим і другим бобом	ознака не визначалась	0
36	Квітконіжка: кількість приквітков	ознака не визначалась	0
37	Біб: за довжиною	довгий	7
38	Біб: за шириною	вузький	3
39	Біб: пергаментність	відсутня або часткова	1
40	За винятком пергаментних сортів. Біб: потовщення стулок	відсутнє	1
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2
42	Біб: ступінь вигину	відсутній або дуже слабкий	1
43	Біб: колір	зелений	2
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (Озн. 43: стан 2): інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
45	За винятком пергаментних сортів. Біб: волокна шва	відсутні	1
46	Біб: кількість насінних зачатків	багато	7
47	Не стигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
48	Насінина: загальна форма	сферична	5
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкватість сім'ядолей	ознака не визначається	0
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: ступінь зморшкватості сім'ядолей	ознака не визначається	0

52	Насіннина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2
53	Лише сорти з антоціаном. Насіннина: мармуровість насінної шкірки	ознака не визначається	0
54	Лише сорти з антоціаном. Насіннина: фіолетові чи рожеві плями на насінній шкірці	ознака не визначається	0
55	Насіннина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінної шкірки	1
56	Лише сорти з антоціаном. Насіннина: забарвлення насінної шкірки	ознака не визначається	0
57	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
58,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Pasa 1	ознака не визначалась	0
58,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Pasa 5	ознака не визначалась	0
58,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. pisi Pasa 6	ознака не визначалась	0
59	Стійкість до <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	ознака не визначалась	0
60	Стійкість до <i>Ascochyta pisi</i> , Race C	ознака не визначалась	0
61	Стійкість до <i>Erysiphe communis</i> Syd.	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	22,8	28,5	25,2
Гарантована прибавка, ц/га	3,6	2,2	-1
%	18,7	8	-4
Вегетаційний період, дн	74,4	76,9	80,9
Стійкість до:			
-вилягання	8,6	8,5	8,6
-осипання	8,3	8,2	7,8
-посухи	8,3	8,2	7,8
-аскохітозу	8,9	8,8	8,5
-антракнозу	8,9	8,3	8,5
-корневих гнилей	9,0	8,6	8,6
Якісні характеристики:			
-вміст білку, %	23,6	23,0	23,4
-збір білку з 1 га	5,4	6,5	5,9
Напрямок використання	зерно	зерно	зерно
Висота рослини, см	52,4	60,9	75,5
Маса 1000 насінин, г	235,3	231,4	238,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся