

Вид: Кабачок Cucurbita pepo L.var. giromontia Duch.

Заявка №: 09026005 Назва сорту: Голд Раш F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140004

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: форма сім'ядолей	вузькоеліптична	1
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	світле	3
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	випукла	3
4	Рослина: габітус	кущовий	1
5	Рослина: галуження	відсутнє	1
6	Рослина: галуження стебла	ознака не визначалась	0
7	Тільки для кущових сортів. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	від прямого до напівпрямого	2
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1
12	Листкова пластинка: за розміром	середня	5
13	Листкова пластинка: розсіченість	глибока	7
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	темне	7
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	наявна	9
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	середня	5
17	Черешок: за довжиною	середній	5
18	Черешок: кількість шипів	кілька	3
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	відсутнє	1
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	ознака не визначалась	0
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0
22	Чоловіча квітка: вираження кільця всередині віночка	наявне	9
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте і зелене	3
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення кільця всередині віночка	ознака не визначається	0
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	велике	7
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважна форма	циліндрична	5
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або борозенок)	жовте	3
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	темне	7
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0
30	Плід: переважна форма	циліндрична	9
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	середній	5
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	середній	5
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	середнє	5
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: за розміром	ознака не визначається	0
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: за розміром	ознака не визначається	0
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираженість екваторіального краю	ознака не визначається	0
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма маточкового кінця	ознака не визначається	0
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0

41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	відсутнє	1
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: форма маточкового кінця	округла	1
46	Плід: борозенки	відсутні	1
47	Плід: глибина борозенок	ознака не визначалась	0
48	Плід: ребра	наявні	9
49	Плід: ступінь виявлення ребер	слабко	3
50	Плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення плям, крапок, смужок і смуг не брати до уваги)	жовте	3
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	дуже темне	9
52	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0
53	Лише сорти з основним подвійним забарвленням шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0
54	Плід: смужки на гранях	відсутні	1
55	Плід: колір смужок на гранях	ознака не визначалась	0
56	Плід: забарвлення ребер відносно основного забарвлення шкірки (як для 50)	однакове	1
57	Плід: плямистість	відсутня	1
58	Плід: переважний розмір плям	ознака не визначалась	0
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (плями до уваги не беруть)	відсутнє	1
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначалась	0
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначалась	0
64	Плід: розмір квіткового рубця	великий	7
65	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
66	Плід: забарвлення плодоніжки	частково жовте і частково зелене	3
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	темне	7
68	Плід: крапчастість (плямистість) плодоніжки	наявна	9
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок не брати до уваги)	оранжеве	5
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	світле	3
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення (як для 69)	ознака не визначалась	0
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремowego)	ознака не визначається	0
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначалась	0
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	оранжеве	3
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9
76	Стиглий плід: структура м'якоті	не волокниста	1
77	Насінина: за розміром	середня	5
78	Насінина: форма	широкоеліптична	7
79	Насінина: лушпиння	наявне	9
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2
81	Насіння: за кольором	білувате	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарний урожай – 470 т/га. Тривалість періоду до настання технічної стиглості – 48 діб. Вміст сухої речовини – 3,9%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся