

**Вид:** Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum L.*

**Заявка № 15013001 Назва сорту:** Кайдашиха **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 11.02.2019

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190425**

#### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №  | Ознака                                                                | Проявлення               | Код | Примітка |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| 1  | Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення                   | відсутня або дуже слабка | 1   |          |
| 2  | Рослина: габтус (форма куща)                                          | прямий                   | 1   |          |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                     | слабке                   | 3   |          |
| 4  | Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком                      | велика                   | 7   |          |
| 5  | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)           | середній                 | 5   |          |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві                           | слабкий                  | 3   |          |
| 7  | Колос: восковий наліт                                                 | сильний                  | 7   |          |
| 8  | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі                        | сильний                  | 7   |          |
| 9  | Рослина: за висотою (стебло і колос)                                  | висока                   | 7   |          |
| 10 | Соломина: виловнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом) | слабко виловнена         | 3   |          |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку)                                           | піраміdalna              | 1   |          |
| 12 | Колос: за щільністю                                                   | середній                 | 5   |          |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців)                             | довгий                   | 7   |          |
| 14 | Колос: остюки або зубці: ніжніх квіткових лусок                       | наявні остюки            | 3   |          |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною                         | середні                  | 5   |          |
| 16 | Колос: забарвлення                                                    | біле або солом'яно-жовте | 1   |          |
| 17 | Соломина: опущення опуклої поверхні верхнього вузла                   | помірне                  | 5   |          |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)  | середнє                  | 5   |          |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече за формою                                | піднесене                | 4   |          |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною                            | довгий                   | 9   |          |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою                              | середньо зігнутий        | 5   |          |
| 22 | Нижня колоскова луска: опущення внутрішньої поверхні                  | слабке                   | 3   |          |
| 23 | Нижня квіткова луска. Зубець: за формою                               | ознака не визначалась    | 0   |          |
| 24 | Зернівка: забарвлення                                                 | червоне                  | 2   |          |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі                                        | ознака не визначалась    | 0   |          |
| 26 | Тип розвитку                                                          | ярий                     | 3   |          |
| 27 | Зернівка: за довжиною                                                 | середня                  | 5   |          |
| 28 | Зернівка: за шириною                                                  | середня                  | 5   |          |
| 29 | Зернівка: відношення довжина +/ ширіна                                | середнє                  | 5   |          |
| 30 | Зернівка: за крупністю                                                | середня                  | 5   |          |
| 31 | Язичок: виявлення                                                     | середній                 | 5   |          |
| 33 | Вушка: за формою                                                      | гострі                   | 2   |          |
| 34 | Колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні                         | слабке                   | 3   |          |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)    | яйцеподібна              | 1   |          |

#### Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник                                                                                      | Значення |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
|                                                                                               | С        | Л    | П    |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 24,0     | 38,3 | 35,1 |
| Довірчий інтервал, ц/га (±)                                                                   | 1,7      | 1,8  | 1,1  |
| Урожайність, ц/га                                                                             | 18,8     | 39,1 | 34,3 |
| +,- до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га                                  | -5,2     | 0,8  | -0,8 |
| +,- до усередненого значення за п'ять попередніх років, %                                     | -21,7    | 2,1  | 2,3  |
| Маса 1000 зерен, г                                                                            | 35,7     | 42,9 | 46,3 |
| Висота рослин, см                                                                             | 75,1     | 82,5 | 88,0 |
| Тривалість періоду вегетації, діб                                                             | 89       | 85   | 94   |
| Стійкість до вилягання, бал                                                                   | 8        | 9    | 8    |
| Стійкість до обсипання, бал                                                                   | 8        | 9    | 9    |
| Стійкість до посухи, бал                                                                      | 7        | 8    | 8    |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал                                                         | 9        | 9    | 9    |
| Стійкість проти бурої іржі, бал                                                               | 9        | 9    | 8    |
| Стійкість проти кореневих гнилей, бал                                                         | 9        | 9    | 9    |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал                                                         | 9        | 9    | 9    |
| Стійкість проти клопа-черепашки, бал                                                          | 9        | 9    | 9    |
| Стійкість проти мухи шведської, бал                                                           | 9        | 9    | 9    |
| Якість:                                                                                       |          |      |      |
| вміст білка, %                                                                                | 14,8     | 15,8 | 16,2 |
| вміст клейковини, %                                                                           | 30,0     | 32,0 | 32,4 |
| сила борошна (W, о.а.)                                                                        | 318      | 375  | 464  |
| об'єм хліба, мл                                                                               | 1160     | 1240 | 1090 |
| За хлібопекарськими якостями                                                                  | слн      | слн  | слн  |
| Напрям використання                                                                           | зерн     | зерн | зерн |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.