

Вид: Картопля Solanum tuberosum L.

Заявка №: 09031003 Назва сорту ВР 808

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 29.10.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.04.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130100

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|--------------------------|-----|
| 1 | Світловий паросток: за розміром | великий | 7 |
| 2 | Світловий паросток: за формою | круглий | 1 |
| 3 | Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи | дуже сильна | 9 |
| 4 | Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи | велике | 3 |
| 5 | Світловий паросток: опушення основи | помірне | 5 |
| 6 | Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою | велика | 7 |
| 7 | Світловий паросток: характеристика верхівки | проміжна | 3 |
| 8 | Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки | дуже сильне | 9 |
| 9 | Світловий паросток: опушення верхівки | дуже сильне | 9 |
| 10 | Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків | середня кількість | 5 |
| 11 | Світловий паросток: довжина бічних пагінців | середні | 5 |
| 12 | Рослина: тип розвитку | листяковий | 3 |
| 13 | Рослина: габітус | напіврозлогий | 5 |
| 14 | Стебло: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 15 | Листок: загальний розмір | середній | 5 |
| 16 | Листок: відкритість | проміжний | 3 |
| 17 | Листок: виявлення вторинних листочків | помірне | 5 |
| 18 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | світле | 3 |
| 19 | Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 20 | Друга пара бічних листочків: за розміром | малі | 3 |
| 21 | Друга пара бічних листочків: за шириною | вузькі | 3 |
| 22 | Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення | відсутні або дуже рідко | 1 |
| 23 | Листочок: хвилястість краю | слабка | 3 |
| 24 | Листочок: глибина жилок | середнє | 5 |
| 25 | Листочок: глянуватість верхнього боку | помірно глянуватий | 5 |
| 26 | Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки | наявна | 9 |
| 27 | Бутон: антоціанове забарвлення | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 28 | Рослина: за висотою | середня | 5 |
| 29 | Рослина: ясність цвітіння | помірне | 5 |
| 30 | Суцвіття: за розміром | середнє | 5 |
| 31 | Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки | слабке | 3 |
| 32 | Віночок квітки: розмір | великий | 7 |
| 33 | Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку | слабке | 3 |
| 34 | Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку | середнє | 2 |
| 35 | Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці | мале | 3 |
| 36 | Рослина: час досягання | середній | 5 |
| 37 | Бульба: форма | куляста | 1 |
| 38 | Бульба: глибина вічок | середні | 5 |
| 39 | Бульба: колір шкірки | жовтий | 2 |
| 40 | Бульба: забарвлення основи вічка | жовте | 2 |
| 41 | Бульба: забарвлення м'якоті | помірно жовте | 4 |
| 42 | Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла | слабке | 3 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|--|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | | 182,9 | 258,1 |
| Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га | | 9,5 | 20,2 |
| Гарантована прибавка (до національного стандарту), % | | 5 | 8 |
| Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га | | -51,9 | -19 |
| Гарантована прибавка (до умовного стандарту), % | | -22 | -7 |
| Вміст крохмалю, % | | 19,9 | 18,3 |

| | | |
|--|---------|------|
| Збір крохмалю, ц/га | 33,7 | 42,4 |
| Вміст сухої речовини, % | 26,6 | 27,2 |
| Вегетаційний період, днів | 91 | 80 |
| Маса бульб, г | 83 | 75,7 |
| Смакові якості, б | 7,7 | 8,7 |
| Товарність бульб, % | 86 | 94 |
| Лежкість, бал | 7,3 | 7 |
| Стійкість до пошкодження нематодою | стійкий | |
| Стійкість до звичайного патотипу збудника раку | стійкий | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся