

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка №: 09034009 Назва сорту Карведжо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140059

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: ширина розетки	вузька	3
2	Листок: за положенням у просторі	горизонтальний	5
3	Листок: за довжиною (разом із черешком)	короткий	3
4	Листок: розсіченість	тонка	3
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	дуже довгий	9
8	Коренеплід: за шириною	середній	5
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	мале	3
10	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	вузькотрикутна	4
11	Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	ознака не визначалась	0
12	Коренеплід: форма плеча	округла	3
13	Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований)	тупа	1
14	Коренеплід: колір поверхні	оранжевий	3
15	За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	сильна	7
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1
17	Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча	малий	3
18	Коренеплід: наявність борозенок на поверхні	слабко виражені	3
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	сильне	7
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	оранжеве	3
23	За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення шкірки	сильне	7
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки	темніша	3
25	Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у повздовжньому розрізі)	слабке	3
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3
27	Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення верхівки	середній	5
29	Рослина: тенденція до стрілкування	ознака не визначалась	0
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	ознака не визначалась	0
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість періоду до досягання 125 діб. Вміст сухої речовини 11,1 %. Вміст загального цукру 6,07%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся