

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка №: 10034001 Назва сорту Кордоба F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

05.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140206

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: ширина розетки	широка	7
2	Листок: за положенням у просторі	горизонтальний	5
3	Листок: за довжиною (разом із черешком)	довгий	7
4	Листок: розсіченість	помірна	5
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5
8	Коренеплід: за шириною	широкий	7
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5
10	Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі	майже трикутна	3
11	Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми	ознака не визначалась	0
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1
13	Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований)	сильно загострена	3
14	Коренеплід: колір поверхні	оранжевий	3
15	За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1
17	Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча	малий	3
18	Коренеплід: наявність борозенок на поверхні	помірно виражені	5
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3
21	За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірне	5
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	оранжеве	3
23	За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення шкірки	помірне	5
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки	однакова	2
25	Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у повздовжньому розрізі)	слабке	3
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3
27	Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки	ознака не визначається	0
28	Коренеплід: час забарвлення верхівки	ранній	3
29	Рослина: тенденція до стрілкування	слабка	3
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	ознака не визначалась	0
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість періоду до досягання 120 діб. Вміст сухої речовини 8,0 %

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся