

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка №: 09034012 Назва сорту Санта Круз F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

24.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140061

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|------------------------------|-----|
| 1 | Листки: ширина розетки | середня | 5 |
| 2 | Листок: за положенням у просторі | горизонтальний | 5 |
| 3 | Листок: за довжиною (разом із черешком) | середній | 5 |
| 4 | Листок: розсіченість | помірна | 5 |
| 5 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірне | 5 |
| 6 | Листок: антоціанове забарвлення черешка | відсутнє | 1 |
| 7 | Коренеплід: за довжиною | довгий | 7 |
| 8 | Коренеплід: за шириною | середній | 5 |
| 9 | Коренеплід: відношення довжина/ширина | середнє | 5 |
| 10 | Коренеплід: форма у поздовжньому розрізі | майже трикутна | 3 |
| 11 | Сорти оцінені в проміжку 4 і 6 для ознаки 10: Коренеплід: тенденція до конічної форми | ознака не визначалась | 0 |
| 12 | Коренеплід: форма плеча | округла | 3 |
| 13 | Коренеплід: форма кінчика (повністю сформований) | сильно загострена | 3 |
| 14 | Коренеплід: колір поверхні | оранжевий | 3 |
| 15 | За винятком сортів з білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні | сильна | 7 |
| 16 | Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча | наявне | 9 |
| 17 | Коренеплід: розмір зеленого забарвлення поверхні плеча | відсутній або дуже малий | 1 |
| 18 | Коренеплід: наявність борозенок на поверхні | відсутні або слабко виражені | 1 |
| 19 | Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра | великий | 7 |
| 20 | Коренеплід: забарвлення серцевини | оранжеве | 3 |
| 21 | За винятком сортів з білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини | сильне | 7 |
| 22 | Коренеплід: забарвлення шкірки | оранжеве | 3 |
| 23 | За винятком сортів з білою шкіркою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення шкірки | помірне | 5 |
| 24 | Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням шкірки | темніша | 3 |
| 25 | Коренеплід: зелене забарвлення внутрішньої частини верхівки (у повздовжньому розрізі) | слабке | 3 |
| 26 | Коренеплід: надземна частина | мала | 3 |
| 27 | Тільки сорти з тупими верхівками. Коренеплід: час розвитку заокругленої верхівки | ознака не визначається | 0 |
| 28 | Коренеплід: час забарвлення верхівки | ознака не визначалась | 0 |
| 29 | Рослина: тенденція до стрілкування | ознака не визначалась | 0 |
| 30 | Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння | ознака не визначалась | 0 |
| 31 | Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю | ознака не визначалась | 0 |
| 32 | Рослина: тип чоловічої стерильності | ознака не визначалась | 0 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість періоду до досягання 110 діб. Вміст сухої речовини 12,1 %. Вміст загального цукру 7,17%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся