

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка №: 08058001 Назва сорту Дорадо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

21.05.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130381

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	прямий	1
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	ознака не визначалась	0
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	довга	7
5	Час початку цвітіння	середній	5
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	середня частота	5
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	рідко	3
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	рідко	3
9	Стебло: довжина найдовшого стебла за повного цвітіння (повністю сформоване суцвіття включно)	довге	7
10	Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 1-го скошування)	середня	5
11	Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 2-го скошування)	низька	3
12	Рослина: за природною висотою (через 3 тижні після 3-го скошування)	низька	3
13	Рослина: за природною висотою (після 4-го скошування)	ознака не визначена	0
14	Рослина: за природною висотою (через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні до рівнодення)	ознака не визначалась	0
15	Рослина: за природною висотою (через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби) (скошування за 2 тижні після рівнодення)	ознака не визначалась	0
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	ознака не визначалась	0
17	Стійкість до <i>Verticillium alboatrum</i>	висока	7
18	Стійкість до <i>Ditylenchus dipsaci</i>	ознака не визначалась	0
19	Стійкість до <i>Colletotrichum trifolii</i>	ознака не визначалась	0
20	Стійкість до <i>Phytophthora medicaginis</i>	ознака не визначалась	0
21	Стійкість до <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	ознака не визначалась	0
22	Стійкість до <i>Therioaphis maculata</i>	ознака не визначалась	0
23	Стійкість до <i>Verticillium alboatrum</i>	ознака не визначалась	0
24	Стійкість до <i>Ditylenchus dipsaci</i>	ознака не визначалась	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини ц/га	141,0	87,4	97,1
Гарантована прибавка			
ц/га	32,6	-17,8	-17
%	30	-17	-15
Діб до досягання	74	62	91
Стійкість, бал до			
вилагання	9,0	8,8	8,9
посухи	9,0	8,3	8,9
іржі	9,0	9,0	9,0
бурої плямистості	9,0	9,0	8,7
Перезимувало рослин, бал	9,0	8,6	7,2
Залистяність, %	53,8	46,3	44,1
Вміст сирого протеїну, %	22,4	20,1	19,3
Напрямок використання	сін. пасов.	.	.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ