

**Вид:** Ячмінь звичайний (озимий) – батьківський компонент *Hordeum vulgare* L.

**Заявка № 16919004 Назва сорту:** PE17 **Заявник (код):** 1959 **Власник сорту (код):** 1959

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.11.2018

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 181107**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака   | Проявлення               | Код | Примітка |
|----|--|--------------------------|-----|----------|
| 1  | Рослина: форма куща (габітус)  | напівпрямостоячий        | 3   |          |
| 2  | Нижні листки: опушення піхви   | наявне                   | 9   |          |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                                  | відсутнє                 | 1   |          |
| 4  | Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок                  | ознака не визначається   | 0   |          |
| 5  | Рослина: частота рослин з похилим прапорцевим листком                              | мало                     | 3   |          |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві  | слабкий                  | 3   |          |
| 7  | Початок колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)                            | середнє                  | 5   |          |
| 8  | Остюки: наявність антоціанового забарвлення кінчиків                               | наявне                   | 9   |          |
| 9  | Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків                           | відсутнє або слабке      | 1   |          |
| 10 | Колос: восковий наліт  | слабкий                  | 3   |          |
| 11 | Колос: положення у просторі  | напівпряме               | 3   |          |
| 12 | Рослина: за висотою (стебло і колос без остюків)                                   | низька                   | 3   |          |
| 13 | Колос: кількість рядів   | більше двох              | 2   |          |
| 14 | Колос: форма   | циліндрична              | 5   |          |
| 15 | Колос: за щільністю  | середній                 | 5   |          |
| 16 | Колос: за довжиною (без остюків)   | середній                 | 2   |          |
| 18 | Стрижень колосу: довжина першого сегменту  | середній                 | 5   |          |
| 19 | Стрижень колоса: вигин першого сегмента  | помірний                 | 5   |          |
| 20 | Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)                          | ознака не визначається   | 0   |          |
| 21 | Середній колосок: довжина колоскової луски і остюка відносно зернівки              | довша                    | 3   |          |
| 22 | Зернівка: довжина волосків основної щетинки  | довгі                    | 2   |          |
| 23 | Зернівка: наявність півки  | наявна                   | 9   |          |
| 24 | Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 25 | Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски               | слабке                   | 3   |          |
| 26 | Зернівка: опушення вентральної боріздки  | наявне                   | 9   |          |
| 27 | Зернівка: розташування лодикул   | охоплююче                | 2   |          |
| 28 | Зернівка: забарвлення алейронового шару  | слабко забарвлена        | 2   |          |
| 29 | Тип розвитку   | озимий                   | 1   |          |
| 30 | Колос: остюки  | наявні                   | 9   |          |
| 31 | Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення                              | остюки                   | 5   |          |
| 32 | Зернівка: форма  | видовжено-еліптична      | 5   |          |
| 33 | Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски                                      | тонкозморшківата         | 1   |          |
| 34 | Тільки для півчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски         | відсутнє                 | 9   |          |
| 35 | Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка                         | поступовий               | 2   |          |
| 36 | Вушка: форма верхівки  | загострена               | 2   |          |
| 37 | Вушка: охоплення соломини  | неповне                  | 1   |          |
| 38 | Язичок: ступінь виявлення  | середній                 | 5   |          |
| 39 | Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)                 | слабко виповнена         | 3   |          |
| 40 | Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)                                   | наявна                   | 9   |          |