

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*
Заявка №: 08016032 **Назва сорту** Бенефіт

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.09.2012 **Патент №:** 120381

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.03.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130256

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	темний	7
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	пізній	7
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	23,8	26,3	26,3
Прибавка до національного стандарту, ц/га	1,4	2,6	0,7
Прибавка до національного стандарту, %	6,2	11,1	2,8
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-6,0	-9,8	-3,8
Прибавка до умовного стандарту, %	-20	-27	-13
Максимальна урожайність, ц/га	34,8	45,1	38,8
Стійкість до: вилягання	8,3	8,8	8,6
-посухи	8,4	7,9	8,8
-осипання	7,3	7,3	6,8
-ріпакового квіткоїду	8,3	9,0	7,6
-бактеріозу	8,7	9,0	9,0
-пероноспорозу	8,7	9,0	9,0
Зимостійкість, бал	5,3	6,8	8,5
Вміст жиру, %	44,1	44,8	44,9
Вміст білку, %	23,7	23,4	21,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,0	0,1	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,7
Тип по якості		00	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся