

Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera
 Заявка №: 10016044 Назва сорту ГКХ 2624

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 30.07.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

01.08.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130437

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	темний	7
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	17,0	28,6	26,2
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-3,2	2,6	1,3
Прибавка до національного стандарту, %	-15,9	10,1	5,2
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-7,1	-3,3	-3,6
Прибавка до умовного стандарту, %	-30	-10	-12
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,4	8,4
Стійкість до посухи, бал	7,3	7,3	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,5	6,8	7,3
Зимостійкість, бал	5,5	6,8	8,4
Дані ІР ім Юр'єва: % живих рослин		67,3	
Дані ІР ім Юр'єва: бал зимостійкості		6,7	
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	7,4	9,0	8,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	43,7	44,7	46,3
Вміст білку, %	25,0	24,6	20,4
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,2	0,0
Вміст глікозинолатів, %	1,0	1,1	0,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп. Полісся