

Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera

Заявка №: 08016038 Назва сорту ДК Екстрон

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №: .

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

12.02.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130257

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	дуже довга	9
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	27,8	30,7	32,5
Прибавка до національного стандарту, ц/га	5,4	7,0	6,9
Прибавка до національного стандарту, %	24,0	29,7	27,0
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-2,1	-5,4	2,4
Прибавка до умовного стандарту, %	-7	-15	8
Максимальна урожайність, ц/га	51,1	46,1	43,5
Стійкість до: вилягання	8,4	8,8	8,8
-посухи	8,6	7,9	8,7
-осипання	8,2	7,3	7,3
-ріпакового квіткоїду	8,1	9,0	7,6
-бактеріозу	8,7	9,0	9,0
-пероноспорозу	8,7	9,0	9,0
Зимостійкість, бал	5,7	7,5	8,4
Вміст жиру, %	44,4	44,7	44,9
Вміст білку, %	22,9	22,2	21,6
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,0	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,6
Тип по якості		00	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся