

Вид: Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera
 Заявка №: 09016178 Назва сорту Озорно

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 01.08.2013 Патент №: 130037

Дата пріоритету 27.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.06.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130407

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	15,0	19,5	22,5
Прибавка до національного стандарту, ц/га	0,6	1,8	2,4
Прибавка до національного стандарту, %	4,0	10,3	11,8
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	1,5	-3,0	2,7
Прибавка до умовного стандарту, %	11	-13	14
Стійкість до, бал: - вилягання	9,0	8,8	8,7
-посухи	6,7	6,8	8,6
-осипання	6,4	7,2	7,3
-ріпакового квіткоїду	8,8	9,0	8,3
-бактеріозу	9,0	9,0	9,0
-пероноспорозу	9,0	9,0	8,8
Вміст жиру, %	44,3	41,8	44,5
Вміст білку, %	25,5	25,7	23,4
Вміст ерукової кислоти, %	0,2	0,1	0,2
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,7	0,6
Тип по якості		00	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся