

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.

Заявка №: 09018011 Назва сорту Спритна

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 18.10.2013 Патент №: 130135

Дата пріоритету 23.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

16.05.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130423

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|---|-----|
| 1 | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення | вісутнє | 1 |
| 2 | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | ознака не визначалась | 0 |
| 3 | Рослина: тип росту | від напівдетермінантного до індетермінантного | 3 |
| 4 | Рослина: форма росту | ознака не визначалась | 0 |
| 5 | Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) | сіре | 1 |
| 6 | Рослина: за висотою | від середньої до високої | 6 |
| 7 | Листок: пухирчатість | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 8 | Листок: форма бічного листочка (складного листка) | ознака не визначалась | 0 |
| 9 | Листок: розмір бічного листочка | ознака не визначалась | 0 |
| 10 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірне | 5 |
| 11 | Квітка: забарвлення | біле | 1 |
| 12 | Біб: інтенсивність коричневого забарвлення | світле | 3 |
| 13 | Насіння: маса 1000 шт. | середня | 5 |
| 14 | Насіння: форма | куляста | 1 |
| 15 | Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) | жовто-зелене | 2 |
| 16 | Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці | ознака не визначалась | 0 |
| 17 | Насіння: забарвлення рубчика | жовте | 2 |
| 18 | Насіння: забарвлення сім'янки рубчика | ознака не визначалась | 0 |
| 19 | Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою) | від раннього до середнього | 4 |
| 20 | Рослина: час досягання | від раннього до середнього | 4 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Урожайність, ц/га | 19,7 | 21,6 | 19,2 |
| Прибавка до національного стандарту, ц/га | 0,6 | -1,3 | -0,1 |
| Прибавка до національного стандарту, % | 3,4 | -5,7 | -0,5 |
| Прибавка до умовного стандарту, ц/га | -0,9 | -1,9 | -1,5 |
| Прибавка до умовного стандарту, % | -4 | -8 | -7 |
| Маса 1000 насінин, г | 146,9 | 157,5 | 175,9 |
| Висота рослин, см | 64,1 | 66,2 | 68,5 |
| Вегетаційний період, днів | 108 | 115 | 129 |
| Стійкість до вилягання, бал | 8,9 | 8,6 | 7,8 |
| Стійкість до осипання, бал | 8,4 | 8,4 | 8,8 |
| Стійкість до засухи, бал | 7,6 | 8,1 | 8,3 |
| Висота прикріплення нижнього бобу, см | 9,2 | 10,8 | 9,7 |
| Стійкість до пероноспорозу, бал | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Стійкість до аскохітозу, бал | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Стійкість до бактеріозу, бал | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Стійкість до септоріозу, бал | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Стійкість до фузаріозу, бал | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Вміст білку, % | 40,6 | 39,8 | 39,3 |
| Вміст олії, % | 19,5 | 19,9 | 19,5 |

Географічні та нові рекомендації використання сорту

Степ