

Вид: Нектарин Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) Schneid.

Заявка №: 11396001 Назва сорту Рубіновий 9

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.06.2013 Патент №: 130263

Дата пріоритету 05.01.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

19.06.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130383

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за висотою	середнє	5
2	Дерево: сила росту	середньої сили	5
3	Дерево: габітус	розлогий	5
4	Квітконосний пагін: за товщиною (без плодкових гілочок)	середній	5
5	Квітконосний пагін: довжина міжвузлів (без плодкових гілочок)	середні	5
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення верхівки (без плодкових гілочок, визначається з тінювого боку)	наявне	9
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення верхівки (як для 6)	помірна	5
8	Квітконосний пагін: щільність розміщення генеративних бруньок (як для 4)	помірно	5
9	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок (як для 4)	по дві і більше	2
10	Квітка: за яскравістю	яскрава	2
11	Чашечка: забарвлення із внутрішнього боку (визначається на відкритій квітці до обпадання пелюсток)	оранжеве	2
12	Віночок: переважаючий колір (із внутрішнього боку)	рожевий	4
13	Пелюстка: форма	округла	3
14	Пелюстка: розмір	велика	7
15	Пелюстки: кількість	п'ять	1
16	Тичинки: положення відносно пелюсток	на одному рівні	2
17	Приймочка: положення відносно пиляків	вище	3
18	Пиляки: наявність пилку	наявний	9
19	Зав'язь: опушення	відсутнє	1
20	Молодий пагін: прилистки за довжиною (визначається на листках, що повністю розгорнулись)	середні	5
21	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
22	Листкова пластинка: за шириною	середня	5
23	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5
24	Листкова пластинка: форма у поперечному перерізі	увігнута	1
25	Листкова пластинка: загин верхівки	наявний	9
26	Листкова пластинка: кут біля основи	гострий	1
27	Листкова пластинка: кут біля верхівки	великий	7
28	Листкова пластинка: забарвлення	зелене	2
29	Черешок листка: за довжиною	довгий	7
30	Черешок листка: нектарники	наявні	9
31	Черешок листка: форма нектарників	ниркоподібні	2
32	Черешок листка: переважаюча кількість нектарників	два	1
33	Плід: розмір	великий	7
34	Плід: форма (з вентрального боку) (з боку шва)	округла	3
35	Плід: форма маточкового кінця (вигляд з боку ямки плодоніжки)	плаский	3
36	Плід: симетрія (вигляд з маточкового кінця)	симетричний	2
37	Плід: помітність шва	помірна	5
38	Плід: глибина ямки плодоніжки	глибока	7
39	Плід: ширина ямки плодоніжки	середня	5
40	Плід: основний колір	жовтий	9
41	Плід: наявність відтинку (поверхневого кольору)	наявний	9
42	Плід: поверхнє забарвлення	червоне	5
43	Плід: рисунок поверхневого забарвлення	густо-насичений	1
44	Плід: покриття поверхневим забарвленням	велике	7
45	Плід: опушення	відсутнє	1
46	Плід: густина опушення	ознака не визначалась	0
47	Плід: товщина шкірки	середня	5
48	Плід: зростання шкірки з м'якоттю	сильне	7
49	Плід: твердість м'якоти	середня	5
50	Плід: основний колір м'якоти	жовтий	5
51	Плід: антоціанове забарвлення під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1

54	Плід: структура м'якоті	нитчаста	2
55	Плід: солодкий смак	помірний	5
56	Плід: кислий смак	помірний	5
57	Кісточка: розмір порівняно з плодом	велика	7
58	Кісточка: форма (вигляд збоку)	яйцеподібна	4
59	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
60	Кісточка: ямкуватість поверхні	ямки та боріздки	4
61	Кісточка: здатність до розтріскування (розколювання) (визначається у період максимуму врожаю)	відсутня або дуже слабка	1
62	Кісточка: зростання із м'якоттю	відсутнє	1
63	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	слабка	3
64	Час листопаду (коли листки відриваються від бруньок)	пізній	7
65	Час початку цвітіння	середній	5
66	Тривалість цвітіння	довге	7
67	Час споживчої стиглості	пізній	7
68	Здатність врожаю до передчасного обпадання	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

* Середній урожай 138,0 ц/га, урожай з дерева 20,7 кг. Зимостійкість 3 бали. Ураженість борошнистою росою та кучерявістю листя 3 бали. Вміст сухої речовини в плодах 19,2%, загального цукру 10,05%, вітаміну С 9,0 мг%.

* Дані заявника

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ