

Вид: Кукурудза звичайна  
Zea mays L

## ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Назва сорту: Ірша

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 27.03.2012 Патент №:120269

Дата пріоритету: 27.11.2008

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.03.2012

Свідоцтво про державну реєстрацію № 120047

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3
3	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом (листок над верхнім качаном)	середній (26-50)	5
4	Листок: положення листової пластинки у просторі (листок над верхнім качаном)	ледь похиле	31
5	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	3
6	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	4
7	Волоть: час повного цвітіння (середня третина головної осі, 50 % рослин)	від раннього до середнього	1
8	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски (у середній третині головної осі)	відсутнє або дуже слабке	3
9	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за виключенням основи (на середній третині головної осі)	слабке	3
10	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків на середній третині головної осі (на щойно з'явлених пиляках)	слабке	5
11	Волоть: розміщення колосків (на середній третині головної осі)	середньої щільності	5
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками (у нижній третині волоті)	середній (26-50)	3
13	Волоть: положення бічних гілочок на нижній третині волоті	ледь відхилене	3
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок, шт.	мала від 5 до 15	4
15	Качан: час появи "шовку" ( у 50 % рослин)	від раннього до середнього	9
16	Качан: антоціанове забарвлення "шовку"	наявне	3
17	Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення "шовку"	слабка	1
18	Листок: антоціанове забарвлення піхви (середня частина рослини)	відсутнє або дуже слабке	7
19	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки) см	довга від 41 до 50	5
20	Волоть: верхівка головної осі за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки волоті)	середня	5
21	Волоть: бічні гілочки за довжиною	середні	0
22	Лише для самозапильних ліній. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	ознака не визначається	9
23	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються. Рослина: за довжиною (разом із волоттю), см	дуже довга понад 200	1
24	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього початка до висоти рослини	дуже мале	5
25	Листок: пластинка листка за шириною (аналізують листок верхнього качана), см	середня від 8.1 до 10.0	5
26	Качан: ніжка за довжиною , см	середня від 10.1 до 20	5
27	Качан: за довжиною (без обгортки), см	середній (19-22)	5
28	Качан: діаметр (посередені) см	великий від 4,1 до 5,0	7
29	Качан: форма	конусно-циліндрична	2
30	Качан: кількість зернових рядів, шт.	мала від 9 до 14	3

- |   |           |   |
|---|-----------|---|
| 31 Качан: тип зернини (в центральній третині качана)            | зубовий   | 5 |
| 32 Качан: колір верхівки зернини                                | жовтий    | 3 |
| 33 Качан: колір низу зернини                                    | оранжевий | 5 |
| 34 Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня                 | наявне    | 9 |
| 35 Качан: інтенсивність антоціанового забарвлення лусок стрижня | сильна    | 7 |

Код	Проявлення	Оцінка
1	Середня	1-10
2	Середня	11-20
3	Середня (25-30)	21-30
4	Середня	31-40
5	Середня	41-50
6	Середня	51-60
7	Середня	61-70
8	Середня	71-80
9	Середня	81-90
10	Середня	91-100
11	Середня	101-110
12	Середня (25-30)	111-120
13	Середня	121-130
14	Середня	131-140
15	Середня	141-150
16	Середня	151-160
17	Середня	161-170
18	Середня	171-180
19	Середня	181-190
20	Середня	191-200
21	Середня	201-210
22	Середня	211-220
23	Середня	221-230
24	Середня	231-240
25	Середня	241-250
26	Середня	251-260
27	Середня	261-270
28	Середня	271-280
29	Середня	281-290
30	Середня	291-300