

Вид: Флокс волотистий Phlox paniculata L.

Заявка №: 11248002 Назва сорту Голубка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 31.01.2013 Патент №: 130013

Дата пріоритету 12.08.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 30.01.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130343

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|------------------------|-----|
| 1 | Рослина: за висотою | середня | 5 |
| 2 | Рослина: габітус | напіврозлогий | 2 |
| 3 | Стебло: наявність антоціанового забарвлення | відсутнє | 1 |
| 4 | Стебло: опушеність | відсутня | 1 |
| 5 | Стебло: забарвлення під час повного цвітіння | темно-зелене | 4 |
| 6 | Листок: форма | широколанцетна | 2 |
| 7 | Листок: антоціанове забарвлення верхнього боку | відсутнє | 1 |
| 8 | Листок: основне забарвлення під час цвітіння | зелене | 2 |
| 9 | Листок: строкатість | відсутня | 1 |
| 10 | Листок: додаткове забарвлення у строкатолисткових сортів | ознака не визначається | 0 |
| 11 | Листок: характер виявлення додаткового забарвлення | ознака не визначається | 0 |
| 12 | Листок: опушеність нижнього боку | відсутня | 1 |
| 13 | Листок: положення стосовно стебла (в середній третині) | спрямований донизу | 3 |
| 14 | Листок: вигляд у профіль | увігнутий | 1 |
| 15 | Листок: характер розміщення жилок | заглиблені | 2 |
| 16 | Суцвіття: за формою | конічне | 4 |
| 17 | Суцвіття: діаметр | середній | 5 |
| 18 | Суцвіття: за щільністю | щільне | 7 |
| 19 | Квітка: забарвлення пуп'янка | фіолетове | 5 |
| 20 | Квітка: тип розвитку віночка | нормальний | 3 |
| 21 | Квітка: діаметр | середній | 5 |
| 22 | Пелюстки: розташування у сформованому віночку | слабко перекриваються | 2 |
| 23 | Квітка: профіль віночка | увігнутий | 1 |
| 24 | Квітка: тип забарвлення верхнього боку | двоколірний | 2 |
| 25 | Квітка: основне забарвлення верхнього боку віночка | світло синьо-фіолетове | 30 |
| 26 | Квітка: переважаюче забарвлення трубки віночка | синє | 4 |
| 27 | Пелюстка: розподіл забарвлення у одноколірних сортів | ознака не визначалась | 0 |
| 28 | Квітка: тип додаткового забарвлення у дво-триколірних сортів | кільце | 2 |
| 29 | Квітка: додаткове забарвлення у дво-триколірних сортів | пурпурове | 27 |
| 30 | Квітка: стійкість забарвлення до вигорання | не вигорас | 3 |
| 31 | Пелюстка: форма краю | округла | 1 |
| 32 | Рослина: час початку цвітіння | пізній | 7 |
| 33 | Квітка: характер оцвітіння за відцвітання | частково відпадає | 2 |
| 34 | Рослина: плодоношення | наявне | 9 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Період від початку цвітіння до втрати декоративності 35 днів. Стійкість до несприятливих погодних умов 8 балів, зимостійкість 9 балів. Стійкість до хвороб і шкідників 7 балів.

*Дані заявника

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Полісся, Лісостеп