

Вид: Баклажан Solanum melongena L.

Заявка №: 07022002 Назва сорту Антрацит F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2013 Патент №: 130161

Дата пріоритету 11.01.2007

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

26.06.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130355

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 1 | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила | відсутнє | 1 |
| 2 | Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотила | ознака не визначається | 0 |
| 3 | Рослина: габітус | напівпрямий | 3 |
| 4 | Рослина: за висотою | середня | 5 |
| 5 | Рослина: за довжиною стебла (від сім'ядольного вузла до 1-ої квітки) | середня | 5 |
| 6 | Стебло: антоціанове забарвлення | наявне | 9 |
| 7 | Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення | слабке | 3 |
| 8 | Стебло: опушення | помірне | 5 |
| 9 | Листкова пластинка: за розміром | середня | 5 |
| 10 | Листкова пластинка: хвилястість краю | сильна | 7 |
| 11 | Листкова пластинка: пухирчастість | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 12 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення | світле | 3 |
| 13 | Суцвіття: кількість квіток | від одної до трьох | 1 |
| 14 | Квітка: за розміром | середня | 5 |
| 15 | Квітка: інтенсивність пурпурового забарвлення | світле | 3 |
| 16 | Плід: за довжиною | середній | 5 |
| 17 | Плід: за діаметром | малий | 3 |
| 18 | Плід: відношення довжина / діаметр | середнє | 5 |
| 19 | Плід: основна форма | булавоподібна | 5 |
| 20 | Плід: розмір рубця маточки | середній | 5 |
| 21 | Плід: форма верхівки | приплюснута | 2 |
| 22 | Плід: глибина зазублення | ознака не визначалась | 0 |
| 23 | Лише для сортів з циліндричними плодами: Плід: вигин | ознака не визначається | 0 |
| 24 | Плід: забарвлення шкірки у товарній стиглості | фіолетове | 3 |
| 25 | Лише для сортів із зеленим і фіолетовим забарвленням шкірки: Плід: інтенсивність забарвлення шкірки (як для 24) | темне | 7 |
| 26 | Плід: глянуватість (як для 24) | сильна | 7 |
| 27 | Плід: плямистість | відсутня | 1 |
| 28 | Плід: смугастість | відсутня | 1 |
| 29 | Плід: випуклість смуг | ознака не визначалась | 0 |
| 30 | Плід: щільність смуг | ознака не визначалась | 0 |
| 31 | Плід: ребристість | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 32 | Плід: довжина квітконіжки | коротка | 3 |
| 33 | Плід: антоціанове забарвлення під чашечкою | відсутнє | 1 |
| 34 | Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення під чашечкою | ознака не визначається | 0 |
| 35 | Плід: розмір чашечки | мала | 3 |
| 36 | Плід: антоціанове забарвлення чашечки | відсутнє | 1 |
| 37 | Плід: інтенсивність антоціанового забарвлення чашечки | ознака не визначається | 0 |
| 38 | Плід: шипуватість чашечки | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 39 | Плід: зморшкуватість чашечки | дуже слабка | 1 |
| 40 | Плід: забарвлення м'якоті | зеленувате | 2 |
| 41 | Плід: забарвлення шкірки за фізіологічної стиглості | вохристе | 3 |
| 42 | Час початку цвітіння | середній | 5 |
| 43 | Час фізіологічної стиглості | середній | 5 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тривалість вегетації 120діб. Вміст сухої речовини в плодах 9%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся