

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка №: 09023001 Назва сорту: Фороно

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

21.03.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130065

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Супліддя	одноросткове	1
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотилія	наявне	9
3	Листок: положення черешка	напівпряме	3
4	Листок: положення пластинки	напівпоникле	7
5	Листок: за довжиною (разом з черешком)	короткий	3
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	5
9	Листкова пластинка: колір	ознака не визначалась	0
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	ознака не визначалась	0
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
13	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
14	Листковий черешок: за шириною основи	середній	5
15	Листковий черешок: основний колір зворотнього боку	пурпуровий	4
16	Коренеплід: заглибленість у ґрунті	глибока	7
17	Коренеплід: форма у повздовжньому розрізі	вузьковидовжена	5
18	Коренеплід: за довжиною	середній	5
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширина	ознака не визначалась	0
21	Коренеплід: форма основи	загострена	1
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	помірне	5
23	Коренеплід: колір шкірки	червонувато-пурпуровий	3
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4
25	Коренеплід: інтенсивність забарвлення м'якоті	темна	7
26	Коренеплід: виявлення кілець	відсутні або дуже слабке	1
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 58 т/га; Маса товарного коренеплоду 100 г.; Тривалість періоду від повних сходів до початку достигання 155 діб; Вміст сухої речовини 14 %; Вміст загального цукру 12%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся