

Вид: Диня звичайна Cucumis melo L.

Заявка №: 08025011 Назва сорту Ананас

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

29.01.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130293

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: довжина гіпокотилу (фаза першого справжнього листка)	короткий	3
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	малі	3
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	слабке	3
4	Листкова пластинка: за розміром	середня	5
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	сильна	7
7	Листкова пластинка: довжина центральної лопаті	середня	5
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	слабка	3
9	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	напівпряме	5
11	Черешок: за довжиною	короткий	3
12	Квітка: за статтю (за повного цвітіння)	андромонеоеційні	2
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	жовтувато-зелене	2
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабке	3
15	Молодий плід: щільність цяток	ознака не визначалась	0
16	Молодий плід: розмір цяток	ознака не визначалась	0
17	Молодий плід: відмінність забарвлення цяток і основного забарвлення	ознака не визначалась	0
18	Молодий плід: вираженість забарвлення жолобків	ознака не визначалась	0
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення жолобків	ознака не визначалась	0
20	Молодий плід: довжина плодоніжки	середня	5
21	Плід: товщина плодоніжки (на відстані 1 см від плоду)	середня	5
22	Молодий плід: поширення темної плями навколо плодоніжки	ознака не визначалась	0
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	ознака не визначалась	0
24	Плід: за довжиною	довгий	7
25	Плід: діаметр	середній	5
26	Плід: відношення довжини до діаметра	від середнього до великого	6
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	кругла	4
29	Плід: основне забарвлення шкірки за досягання	зелене	3
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки за досягання	помірне	5
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки за досягання	відсутній або дуже слабкий	1
32	Плід: щільність розміщення цяток	ознака не визначалась	0
33	Плід: розмір цяток	ознака не визначалась	0
34	Плід: забарвлення цяток	ознака не визначалась	0
35	Плід: інтенсивність забарвлення цяток	ознака не визначалась	0
36	Плід: щільність розміщення плям	ознака не визначалась	0
37	Плід: розмір плям	ознака не визначалась	0
38	Плід: бородавки	ознака не визначалась	0
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	слабка	3
40	Плід: форма основи	заокруглена	2
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2
42	Плід: розмір маточкового рубця	середній	5
43	Плід: борізки	відсутні або дуже слабо виражені	1
44	Плід: ширина боріздки	ознака не визначалась	0
45	Плід: глибина боріздки	ознака не визначалась	0
46	Плід: забарвлення боріздки	ознака не визначалась	0
47	Плід: зморшкуватість поверхні	слабка	3
48	Плід: коркове утворення	наявне	9
49	Плід: товщина коркового шару	тонкий	3
50	Плід: візерунок коркового утворення	лише сіткою	5
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	щільний	7
52	Плід: темп зміни забарвлення шкірки плоду від технічної стиглості до біологічної	ознака не визначалась	0
53	Плід: товщина м'якоті в поздовжньому розрізі (в місці максимального діаметра плоду)	ознака не визначалась	0

54	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжеве	5
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	світле	3
56	Лише для сортів із забарвленням іншим, ніж оранжеве. Плід: вторинний оранжево-рожевий колір м'якоті	ознака не визначається	0
57	Плід: консистенція м'якоті	ознака не визначалась	0
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	ознака не визначається	0
60	Насіннина: за довжиною	ознака не визначалась	0
61	Насіннина: за шириною	ознака не визначалась	0
62	Насіннина: форма	ознака не визначалась	0
63	Насіннина: забарвлення	кремово-жовте	2
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насіннина: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0
65	Час цвітіння чоловічих квіток	ознака не визначалась	0
66	Час цвітіння жіночих квіток	ранній	3
67	Час достигання	ранній	3
68	Термін зберігання плоду	ознака не визначалась	0
69,1	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Melonis</i> : Paca 0	ознака не визначалась	0
69,2	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Melonis</i> : Paca 1	ознака не визначалась	0
69,3	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Melonis</i> : Paca 2	ознака не визначалась	0
69,4	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Melonis</i> : Паси 1-2	ознака не визначалась	0
70,1	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ( <i>Podosphaera xanthii</i> ) (борошнистої роси): Paca 1	ознака не визначалась	0
70,2	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ( <i>Podosphaera xanthii</i> ) (борошнистої роси): Paca 2	ознака не визначалась	0
70,3	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ( <i>Podosphaera xanthii</i> ) (борошнистої роси): Paca 5	ознака не визначалась	0
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> ( <i>Golovinomyces cichoracearum</i> ), Paca 1 (борошнистої роси) сприйнятливий	ознака не визначалась	0
72	Стійкість до колоній <i>Aphis gossypii</i>	ознака не визначалась	0
73	Стійкість до штаму F вірусу жовтої мозаїки цукіні	ознака не визначалась	0
74,1	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV): Paca GVA	ознака не визначалась	0
74,2	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV): Paca E2	ознака не визначалась	0
75	Стійкість до раси E8 вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	ознака не визначалась	0
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальний урожай 5 кг/м<sup>2</sup>; період від повних сходів до першого збору 80 днів; період від садіння 30-ти денної розсади до останнього збирання плодів 15 днів; ураженість борошнистою росю - 0,5 %, бактеріозом - 1,5 %, антракнозом - 0,5 %. Пошкодження шкідниками: попелицею - 0 %. Вміст: сухої речовини у плоді - 10 %, загального цукру - 18 %.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Закритий ґрунт