

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 17045024 Назва сорту: Стайн 15I63 Заявник (код): 2278 Власник сорту (код): 2278

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.02.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190656

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|---|-----|----------|
| 1 | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 2 | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | помірна | 5 | |
| 3 | Рослина: тип росту | від напівдетермінантного до індетермінантного | 3 | |
| 4 | Рослина: габітус (характер росту) | напівпрямий | 3 | |
| 5 | Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) | рудувато-коричневе | 2 | |
| 6 | Рослина: за висотою | від середньої до високої | 6 | |
| 7 | Листок: пухирчастість | слабка | 3 | |
| 8 | Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка) | загостренояцеподібна | 3 | |
| 9 | Листок: розмір бічного листочка | середній | 5 | |
| 10 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 11 | Квітка: забарвлення | фіолетове | 2 | |
| 12 | Біб: інтенсивність коричневого забарвлення | слабка | 3 | |
| 13 | Насінина: розмір | середній | 5 | |
| 14 | Насінина: форма | округло-видовжена | 5 | |
| 15 | Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) | жовте | 1 | |
| 16 | Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази | ознака не визначена | 0 | |
| 17 | Насінина: забарвлення рубчика | чорне | 6 | |
| 18 | Насінина: забарвлення сім'янки рубчика | як у насіннєвій оболонки | 1 | |
| 19 | Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою) | ранній | 3 | |
| 20 | Рослина: час досягання | середній | 5 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 16,7 | 22,9 | 21,0 |
| Довірчий інтервал, ц/га (±) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Урожайність, ц/га | 15,8 | 32,6 | 24,7 |
| +, - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га | -0,9 | 9,7 | 3,7 |
| +, - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, % | -5,2 | 42,3 | 17,4 |
| Тривалість періоду вегетації, діб | 121 | 128 | 128 |
| Маса 1000 насінин, г | 124,9 | 165,1 | 180,1 |
| Висота рослини, см | 76,5 | 83,4 | 95,5 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 7 | 8 |
| Стійкість до обсипання, бал | 8 | 8 | 9 |
| Стійкість до посухи, бал | 8 | 8 | 8 |
| Висота прикріплення нижнього бобу, см | 9,9 | 14,1 | 18,5 |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти аскохітозу, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти бактеріозу, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти септоріозу, бал | 9 | 9 | 9 |
| Стійкість проти фузаріозу, бал | 9 | 9 | 9 |
| Вміст білка, % | 38,7 | 41,0 | 39,2 |
| Вміст олії, % | 22,2 | 21,0 | 22,8 |
| Якість | вл | сл | вл |
| Напрямок використання | зерн | зерн | зерн |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.