

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 17045023 Назва сорту: Стайн 17Ж32 **Заявник (код):** 2278 **Власник сорту (код):** 2278

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.02.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190655

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінневої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	від середнього до пізнього	6	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	17,1	22,4	
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,9	0,9	
Урожайність, ц/га	16,1	33,6	
+, - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-1,0	11,2	
+, - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-5,7	49,8	
Тривалість періоду вегетації, днів	131	128	
Маса 1000 насінин, г	135,8	177,6	
Висота рослини, см	78,8	85,3	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,9	13,5	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	
Вміст білка, %	39,4	41,6	
Вміст олії, %	22,7	19,9	
Якість	вл	сл	
Напрямок використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.