

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка №: 09035003 Назва сорту Сфінкс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.11.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130478

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середні	5
4	Листкова пластинка: положення у просторі	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина верхньої лопаті / довжина пластинки	помірне	5
7	Листкова пластинка: форма верхівки верхньої лопаті	гостра	1
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
9	Листкова пластинка: пухирчатість	сильна	7
10	Листок: хвилястість країв	помірна	2
11	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3
13	Рослина: виявлення статі	однодомність	1
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партеокарпія	відсутня	1
17	Плід: за довжиною	короткий	3
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
20	Плід: відношення діаметра насінної камери до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	куста	3
22	Плід: форма основи плоду	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: довжина шийки	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	тупа	2
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білих сортів: Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	темне	7
27	Плід: ребристість	помірна	2
28	Плід: шви	наявні	9
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9
30	Плід: зморшкуватості	сильна	7
31	Плід: тип покриву	волоски і шипики	2
32	Плід: щільність покриву	дуже щільний	9
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15): Плід: забарвлення зав'язі	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	середні	5
36	Плід: довжина смужок	довгі	7
37	Плід: плямистість	наявна	9
38	Плід: характер поширення плям	переважно смугами	2
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	2/3 довжини	3
40	Плід: щільність плям	щільно	7
41	Плід: наліт	слабкий	3
42	Плід: довжина плодоніжки	середня	5
43	Плід: основний колір шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовтий	2
44	Стійкість до 1) <i>Cladosporium cucumerinum</i>	ознака не визначалась	0
45	Стійкість до звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	ознака не визначалась	0
46	Стійкість до борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	ознака не визначалась	0
47	Стійкість до несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0
48	Стійкість до бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	ознака не визначалась	0
49	Стійкість до вірусу пожовтіння судин огірка (<i>CVYV</i>)	ознака не визначалась	0
50	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки кабачка (<i>ZYMV</i>)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 35т/га. Тривалість періоду від повних сходів до першого збирання 42 діб. Тривалість періоду плодоношення 70 діб. Вміст сухої речовини в плодах 3,6%

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ