

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill

Заявка № 17045018 Назва сорту: Стайн 20Ф26 Заявник (код): 2278 Власник сорту (код): 2278

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.02.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190650

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гілокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гілокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індегримінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від напівпрямого до горизонтального	4	
5	Рослина: забарвлення опушенні головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насініна: розмір	середній	5	
14	Насініна: форма	куляста	1	
15	Насініна: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовто-зелене	2	
16	Насініна: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насініна: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насініна: забарвлення сім'янікки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4	
20	Рослина: час досягнення	пізній	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	17,1	22,4	
Довірчий інтервал, ц/га (\pm)	0,9	0,9	
Урожайність, ц/га	15,5	29,4	
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-1,6	7,0	
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-9,5	31,2	
Тривалість періоду вегетації, діб	133	137	
Маса 1000 насінин, г	133,1	183,7	
Висота рослини, см	71,8	85,6	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсипання, бал	8	8	
Стійкість до посухи, бал	8	8	
Висота прикрілення нижнього бобу, см	11,4	16,3	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	
Вміст білка, %	39,5	38,6	
Вміст олії, %	21,7	20,9	
Якість	сл	сл	
Напрям використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.